

Literaturverzeichnis

Hinweis zur Reihenfolge der Zitate: Die Literaturliste ist grundsätzlich alphabetisch geordnet (Namenszusätze „van“ und „von“ unter V). Gleiche Nachnamen sind unabhängig von den Vornamen nach der Jahreszahl einsortiert. Dies gilt auch für Autorenpaare. Arbeiten von Autorengemeinschaften, die im Text mit „et al.“ zitiert sind, sind ebenfalls nach den Jahreszahlen geordnet, um sie schneller auffin-

den zu können. Sie werden nach den Autorenpaaren aufgeführt. Es gilt also die Reihenfolge Einzelauteur, Autorenpaar, Autorengemeinschaft (drei und mehr Autoren) jeweils nach dem Erscheinungsjahr. Zeitschriftenkürzel nach <http://www.ornithologische-schriften-schau.de/index.php?cat=os&subcat=periodika>. Die Umlaute ä, ö und ü werden wie ae, oe und ue behandelt; ß wie ss.

- ABU [Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.V.] (Hrsg.) (1989): Atlas der Brutvögel des Kreises Soest/Mittelwestfalen 1981-1986. Lohne.
- ADEBAR (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. Unveröffentlichte und vorläufige Arbeitsfassung der Verbreitungskarten und Arttexte.
- Aebischer, N.J. & J.A. Ewald (2010): Grey Partridge *Perdix perdix* in the UK: recovery status, set aside and shooting. *Ibis* 152: 530-542.
- AG Avifauna Hagen (2009): Die Brutvögel Hagens. 1997-2008. Eigenverlag, Hagen.
- AG Greifvögel NRW (1989): Die Bestandsentwicklung des Habichts (*Accipiter gentilis*) in NRW von 1972-1985. *Charadrius* 25: 55-69.
- AG Greifvögel NRW (1996): Die Bestandsentwicklung und der Bruterfolg des Baumfalken (*Falco subbuteo*) in Nordrhein-Westfalen von 1972-1994. *Charadrius* 32: 8-23.
- AG Greifvögel NRW (1997): Die Bestandentwicklung und der Bruterfolg des Rotmilans (*Milvus milvus*) in NRW von 1972 bis 1995. *Charadrius* 33: 1-15.
- AG Greifvögel NRW (2000): Die Bestandsentwicklung und der Bruterfolg des Wespenbussards (*Pernis apivorus*) in NRW von 1972-1998 mit Angaben zu Revierverhalten, Mauser und Beringungsergebnissen. *Charadrius* 36: 58-79.
- AG Greifvögel NRW (2002): Ergebnisse einer 30-jährigen Erfassung der Bestandsentwicklung und des Bruterfolges beim Habicht (*Accipiter gentilis*) in Nordrhein-Westfalen von 1972-2001 (Fortschreibung 1986-2001). *Charadrius* 38: 139-154.
- Albrecht, C., U. Dworschak, T. Esser, H. Klein & J. Weglau (2005): Tiere und Pflanzen in der Rekultivierung. 40 Jahre Freilandforschung im Rheinischen Braunkohlenrevier. *Acta Biologica Benrodis*, Supplement 10. Verlag Natur & Wissenschaft, Solingen.
- Altenkamp, R. & S. Herold (2001): Habicht (*Accipiter gentilis*). In: ABBO (Hrsg.): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Natur & Text, Rangsdorf.
- Andretzke, H., T. Schikore & K. Schröder (2005): Artsteckbriefe. In: Südbeck, P., H. Andretzke, S. Fischer, K. Gedeon, T. Schikore, K. Schröder & C. Sudfeldt (Hrsg.): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands: 135-695. Radolfzell.
- Andris, K. (1996) Zum Brutvorkommen des Orpheusspotters (*Hippolais polyglotta*) in der südbadischen Oberrheinebene. *Nat.schutz südl. Oberrh.* 1: 149-154.
- Andris, K. & K. Westermann (2002): Brutverbreitung, Brutbestand und Aktionsraum-Größe der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) in der südbadischen Oberrheinebene. *Nat.schutz südl. Oberrh.* 3: 113-128.
- Anselin, A., G. Vermeersch & G. Spanoghe (2010): Welcome to the World? Non-native breeding birds in Flanders (Belgium). In: Segers, H. & E. Bracquart (Hrsg.): Science Facing Aliens. Proceedings of a scientific meeting on Invasive Alien Species, Brussels, May 11th 2009. Belgian Biodiversity Platform, 2010.
- Ant, H. (1972): Zum Vorkommen von Greifvögeln in Westfalen in früherer Zeit. *Nat. Heimat* 32: 22-24.
- Anthes, N., R. Gaste & P.-C. Quetz (2002): Bestand und Habitatwahl einer Ackerpopulation der Schafstelze (*Motacilla f. flava*) im Landkreis Ludwigsburg. *Nordwürttemberg. Ornithol. Jahreshfte Baden-Württemberg* 18: 347-361.
- Anthes, N. & H. Schielzeth (2001): Brutvögel der Rieselfelder Münster im Jahr 2000. *Jahresber. Biol. Stat. „Rieselfelder Münster“* 4: 53-57.
- Arlt, D. & T. Pärt (2007): Non-ideal habitat selection: A mismatch between preference and breeding success. *Ecology* 88: 792-801.
- AviKom [Avifaunistische Kommission der NWO] (2007a): Seltene Vogelarten in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2006. *Charadrius* 43: 57-65.
- AviKom [Avifaunistische Kommission der NWO] (2007b): Seltene Vogelarten in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2000-2005. *Charadrius* 43: 66-91.
- AviKom [Avifaunistische Kommission der NWO] (2009): Seltene Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2008. *Charadrius* 45: 105-119.
- AviKom [Avifaunistische Kommission der NWO] (2010): Seltene Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2009. *Charadrius* 46: 137-154.
- AviKom [Avifaunistische Kommission der NWO] (2011): Seltene Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2010. *Charadrius* 47: 209-225.
- Bär, U. & F. Jochums (1995): Übersommernde, mausernde Eiderenten *Somateria mollissima* in Bayern mit Anmerkungen zur Dreikantmuschel *Dreissena polymorpha*. *Ornithol. Anz.* 34: 159-162.
- Barkow, A., F. Bairlein & M. Mühlenberg (2001): First class aus zweiter Hand? – Der Einfluss von Prädation, Störungen und Mahd auf den Bruterfolg von Singvogelpopulationen in Hecken. *Vogelkd. Ber. Niedersachs.* 33: 143-146.
- Bartels, U. & J. Gehrmann (1990): Sind naturnahe Ökosysteme durch Stickstoffträge gefährdet? In: LÖLF (Hrsg.): LÖLF-Jahresber. 1989, Recklinghausen.
- Barthel, P.H. & A.J. Helbig (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 89-111.
- Bastian, A. & H.V. Bastian (1994): Bestände und Bestandstrends des Braunkehlchens *Saxicola rubetra*. *Limicola* 8: 242-270.
- Bastian, A. & H.V. Bastian (1996): Das Braunkehlchen: Opfer der ausgeräumten Kulturlandschaft. *Aula-Verlag, Wiesbaden*.
- Bastian, A., H.V. Bastian & J. Weiß (2011): Etablierung des Bienenfressers *Merops apiaster* als Brutvogel in Rheinland-Pfalz. *Vogelwelt* 132: 113-123.
- Bauer, H.-G. & P. Berthold (1996): Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. *Aula-Verlag, Wiesbaden*.
- Bauer, H.-G., E. Bezzel & W. Fiedler (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Bd. 1, Nonpasseriformes – Nichtsperlingsvögel. *Aula-Verlag, Wiebelsheim*.
- Bauer, H.-G., E. Bezzel & W. Fiedler (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Bd. 2, Passeriformes – Sperlingsvögel. *Aula-Verlag, Wiebelsheim*.
- Bauer, K.M. & U.N. Glutz von Blotzheim (1968): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 2: Anseriformes. *Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main*.
- Bauer, H.-G. & F. Woog (2008): Nichtheimische Vogelarten (Neozoen) in Deutschland, Teil 1: Auftreten, Bestände und Status. *Vogelwarte* 46: 157-194.
- Baumann, S. (1999): Habitat preferences and home range patterns of Eurasian Golden Oriole in Schleswig-Holstein. *Corax* 18: 73-97.
- Baumann, S. (2000): Vergleich von Habitatstruktur und Habitatnutzung im Brutgebiet und Winterareal des Europäischen Pirols (*Oriolus o. oriolus*, L. 1758). *J. Ornithol.* 41: 142-151.
- Baumgart, W. (2000): Die Ausbreitung der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) als Folge politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen auf dem postosmanischen Balkan – Retrospektive und Wertungen. *Berl. ornithol. Ber.* 10: 3-24.
- Becker, P. (1993): Der Birkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*) besiedelt die Innenstadt von Hildesheim. *Vogelkd. Ber. Niedersachs.* 25: 59-62.
- Becker, P. & S. Becker (2002): Ergebnisse der Dohlen-Erfassung (*Corvus monedula spermologus*) in Hessen 2000. *Vogel Umw.* 13: 3-9.
- Becker, P.H. & M. Erdelen (1987): Die Bestandsentwicklung von Brutvögeln der deutschen Nordseeküste 1950-1979. *J. Ornithol.* 128: 1-32.
- Becker, P.H. & S.R. Sudmann (1998): Quo vadis *Sterna hirundo*? Schlußfolgerungen für den Schutz der Flußseeschwalbe. *Vogelwelt* 119: 293-304.
- Beckers, B. (2001/02): Die Disselmersch. *ABU Info* 25/26: 12-21.
- Beenen, H. (1974): Ohligser Avifauna. Solingen.
- Behle, L. (2001): Ein neues Brutvorkommen der Heidelerche (*Lullula arborrea*) im Süderbergland. *Charadrius* 37: 176-178.
- Behle, L. & M. Klein (1999): Erster Brutnachweis der Tafelente (*Aythya ferina*) im Süderbergland. *Charadrius* 35: 88-91.
- Beintema, A.J. & G.J.D.M. Müskens (1987): Nesting success of birds breeding in Dutch agricultural grassland. *J. Appl. Ecol.* 24: 743-758.
- Beintema, A.J., O. Moedt & D. Ellinger (1995): *Ecologische Atlas van de Nederlandse Weidevogels*. Haarlem, Niederlande.
- Beier, J. (1981): Untersuchungen an Drossel- und Teichrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*, *A. scirpaceus*): Bestandsentwicklung, Brutbiologie, Ökologie. *J. Ornithol.* 122: 209-230.

- Beisenherz, W. (2001): Veränderungen der Brutbestände der Elster (*Pica pica*) auf Probeflächen in Bielefeld zwischen 1991 und 2000. *Charadrius* 37: 15-22.
- Bekhuis, J.F., J. Nienhuis, E. Wymenga, N. Beemster & R. van Beusekom (1993): Opmars van de Buidelmeees *Remiz pendulinus* in Nederland in de periode 1988-1992. *Limosa* 66: 97-106.
- Bellebaum, J. (1996): Die Brutvogelgemeinschaften westfälischer Kulturlandschaften. Ornithologische Grundlagen für das Landschaftsmonitoring. Verlag Natur in Buch und Kunst, Neunkirchen-Seelscheid.
- Bellebaum, J. (2002): Ein „Problemvogel“ bekommt Probleme: Bestandsentwicklung der Lachmöwe *Larus ridibundus* in Deutschland 1963-1999. *Vogelwelt* 123: 189-201.
- Bellebaum, J. & D. Ikemeyer (1996): Die Lachmöwe (*Larus ridibundus*) als Brutvogel in Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 32: 170-177.
- Bellebaum, J., A. Helmecke, W. Dittberner & S. Fischer (2002): Bauern und Beutegreifer – was bestimmt den Bruterfolg der Schafstelze in Schutzgebieten? Untersuchungen im Nationalpark „Unteres Odertal“. *Nat. schutz Landsch. plan.* 34: 101-106.
- Belting, S. & H. Belting (1999): Zur Nahrungsökologie von Kiebitz- (*Vanellus vanellus*) und Uferschnepfen- (*Limosa limosa*) Küken im wiedervernässten Niedermoor-Grünland am Dümmer. *Vogelkd. Ber. Niedersachs.* 31: 11-25.
- Bense, A.R. (2000): Altes Storchland an Weser, Bastau und Dümmer. Weißstörche im Kreis Minden-Lübbecke gestern und heute. Hüllhorst: Edition Stadt und Buch, Minden.
- Bense, A.R. (2010): Weißstorch-Jahresbericht 2010 für den Kreis Minden-Lübbecke. Aktionskomitee „Rettet die Weißstörche im Kreis Minden-Lübbecke“ e.V. Petershagen, unveröff. Bericht.
- Bense, A.R. (2011): Storchenhauptstadt Petershagen. Die Rettung des Weißstorches in Nordrhein-Westfalen. Herausgegeben vom Aktionskomitee „Rettet die Weißstörche im Kreis Minden-Lübbecke“. Historisches Jahrbuch Petershagen. Bd. 8, Petershagen.
- Bergerhausen, W. (1994): Wiederausiedlung des Uhus (*Bubo bubo*) in den nordwestdeutschen Mittelgebirgen: Resümee eines Projekts. *Eulen-Rundblick* 40/41:23-31.
- Bergerhausen, W. & A. Gerkowski (1978): Zählungen der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) und Hilfsmaßnahmen im Naturpark Nordeifel. *Charadrius* 14: 44-47.
- Bergmann, R.F. (1990): Rekultivierungsmaßnahmen verhindern Brut der Reiherente (*Aythya fuligula*). *Charadrius* 26: 56.
- Bergmann, R.F., E. Kretzschmar & A. Buchheim (1990): Die Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*) als neuer Brutvogel in Westfalen – vom Zooflüchtling zum Kulturfolger? *Charadrius* 26: 92-98.
- Bergmann, H.-H., S. Klaus, F. Müller, W. Scherzinger, J.E. Swenson & J. Wiesner (1996): Die Haselhühner. NBB 77. Westarp Wissenschaften, Hohenwardersleben.
- Bergmann, F., W. von Eisengrein, E. Gabler, J. Hüttl & F. Schneider (2003): Brutzeitverbreitung und Bestand der Zaunammer (*Emberiza cirulus*) in Südbaden. *Nat.schutz südl. Oberrh.* 4: 1-10.
- Bernardy, P. (2009): Ökologie und Schutz des Ortolans in Europa, IV. Internationales Ortolan-Symposium (8.-10.6.2007) in Hitzacker. Anhang I: Integratives Schutzkonzept zum Erhalt ackerbrütender Vogelgemeinschaften im hannoverschen Wendland. *Nat.schutz Landsch.pfl. Niedersachs.* 45: Anhang 1-70.
- Berndt, R.K. & G. Busche (1985): Orn. Jahresbericht für Schleswig-Holstein 1983. *Corax* 10: 419-467.
- Berndt, R.K. & B. Struwe-Juhl (2004): Warum geht der Brutbestand des Drosselrohrsängers (*Acrocephalus arundinaceus*) in Schleswig-Holstein zurück? *Corax* 19: 281-301.
- Berthold, P. (1973): Über den starken Rückgang der Dorngrasmücke *Sylvia communis* und anderen Singvogelarten im westlichen Europa. *J. Ornithol.* 114: 348-360.
- Berthold, P. (1974): Die gegenwärtige Bestandsentwicklung der Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) und anderer Singvogelarten im westlichen Europa bis 1973. *Vogelwelt* 95: 170-183.
- Berthold, P. (1995): Microevolution of migratory behaviour in a bird species, the Blackcap *Sylvia atricapilla* 1993 Witherby Lecture. *Bird Study* 42: 89-100.
- Berthold, P., W. Fiedler, R. Schlenker & U. Querner (1998): 25-year study of the population development of Central European songbirds: A general decline, most evident in long-distance migrants. *Naturwissenschaften* 85: 350-353.
- Bettmann, H. (1983): Bienenfresser brüten am Niederrhein. *Wild Hund* 86: 70.
- Bezirksregierung Arnsberg – Standort Lippstadt (2009): Lippeaue – Eine Flusslandschaft im Wandel. Broschüre, bearbeitet von der Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.V. (ABU), Lippstadt.
- Bezzel, E. (1982): Vögel in der Kulturlandschaft. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- Bezzel, E. (1992): Habitatnutzung und Bestandsdynamik des Erlenzeisigs (*Carduelis spinus*): Eine langfristige Lokalstudie in den Nordalpen. *Garmischer Vogelkd. Ber.* 21: 12-38.
- Bezzel, E. (1993): Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Passeres – Singvögel. Aula-Verlag, Wiesbaden.
- Bezzel, E., I. Geiersberger, G. Lossow & R. Pfeifer (2005): Brutvögel in Bayern. Verbreitung 1996 bis 1999. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- Bezzel, E. & S. Schuster (2010): Reagieren wärmeliebende Vogelarten in Bayern nicht auf die Klimaerwärmung? *Ornithol. Mitt.* 60: 349-354.
- Bick, U. (1976): Birkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*) Brutvogel in der Nordwest-Eifel und in den Ardennen. *Charadrius* 12: 83.
- Bijleveld, M. (1974): *Birds of Prey in Europe*. Macmillan Press, London.
- Bijlsma, R.G. (1993): *Ecologische atlas van de Nederlandse roofvogels*. Schuyt & Co., Haarlem, NL.
- Bijlsma, R.G. (1994): Ontstaan en groei van een populatie Mandarijneenden *Aix galericulata*. *Limosa* 67: 173-174.
- Bijlsma, R.G., F. Hustings & C.J. Camphuysen (2001): *Algemene en schaarse vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 2)*. GMB Uitgeverij/KNNV, Haarlem/Utrecht.
- Biologische Station Minden-Lübbecke (1989-1993): Ethologische und nahrungsökologische Untersuchungen am Weißstorch. Im Auftrag des Aktionskomitees „Rettet die Weißstörche im Kreis Minden-Lübbecke“, Jahresabschlussberichte.
- Biologische Station Rieselfelder Münster (1981a): Rapider Bestandsrückgang des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*). *Ber. dtsh. Sekt. int. Rat Vogel-schutz* 21: 31-34.
- Biologische Station Rieselfelder Münster (1981b): Die Rieselfelder Münster. Europareservat für Wat- und Wasservogel. Eigenverlag, Münster.
- Biologische Station Rieselfelder Münster (2009): Jahresbericht der Biologischen Station „Rieselfelder Münster“. Eigenverlag, Münster.
- Biologische Station Rieselfelder Münster & Biologische Station Zwillbrock (1983): Zur Bestandsentwicklung der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in Westfalen. *Ber. dtsh. Sekt. int. Rat Vogelschutz* 23: 121-128.
- Biologische Station Siegen-Wittgenstein (2010): 20 Jahre Biologische Station Siegen-Wittgenstein – Eine Bilanz. Eigenverlag, Erndtebrück.
- Biologische Station Zwillbrock (1987): Arbeitsbericht 1987. Vreden.
- BirdLife International (2004): *Birds in Europe: population estimates, trends and a conservation status*. BirdLife Conservation Series No. 12. Cambridge, Großbritannien.
- Blana, H. (1978): Die Bedeutung der Landschaftsstruktur für die Vogelwelt, Modell einer ornithologischen Landschaftsbewertung. *Beitr. Avifauna Rheinland* 12. Düsseldorf.
- Blana, H. (1985): *Bioökologischer Grundlagen- und Bewertungskatalog für die Stadt Dortmund, Teil 3*. Dortmund.
- Bloem, H., K. Boer, N. Groen, R. van Harxen & P. Stroeken (2001): *De Steenuil in Nederland. Handleiding voor onderzoek en bescherming*. Stichting Steenuilenoverleg Nederland (STONE).
- Blühdorn, I. (2001): Zum Brutbestand des Kiebitzes *Vanellus vanellus* im nördlichen Münsterland 1999 im Vergleich zu 1972/73 und 1989/90. *Vogelwelt* 122: 15-28.
- Blume, D. & J. Tiefenbach (1997): Die Buntspechte. NBB 315. Westarp Wissenschaften, Hohenwardersleben.
- Bode, L. & G. Hussmann (1990): Erster Brutnachweis für die Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*) im Rheinland. *Charadrius* 26: 119-120.
- Böhm, K. (1985): Brutnachweis der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) im Kr. Mettmann. *Charadrius* 21: 55.
- Boele, A., A. van Dijk, F. Hustings, J. van Bruggen, K. Koffijberg, J.-W. Vergeer & C. Plate (2011): Kolonievogel en zeldzame broedvogel in Nederland in 2008 en 2009. *Limosa* 83: 61-81.
- Bohrer, K. & J. Niemann (1992): Untersuchungen zur Lebensraumnutzung der Weißstörche in der Weseraue durch die Biologische Station Minden-Lübbecke e.V. *Schriftenr. Umwelt Naturschutz Kreis Minden-Lübbecke Nr. 2*: 12-16.
- Bosch, S. (2004): Mäusebussarde *Buteo buteo* an Autobahnen: Tödliche Turbulenzen. *Ornithol. Mitt.* 56: 233-234.
- Boschert, M. (2005): Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997 bis 2003. *Vogelwelt* 126: 1-51.
- Boschert, M., & C. Münch (2010): Vogelverluste durch Angelschnüre. *Ornithol. Jahresh. Bad.-Württ.* 26: 69-72.
- Bosselmann, J. (1978): Erstbesiedlung und Ausbreitung der Wacholderdrossel – *Turdus pilaris* – im Rheinland. *Charadrius* 14: 81-92.
- Bosselmann, J. (2008): Zippammer-Beobachtungen (*Emberiza cia*) 2005-2008 in Rheinland-Pfalz, Bestandsschätzungen. *Pflanzen Tiere Rheinl.-Pfalz* 18: 152-155.
- Bosselmann, J. & K.H. Christmann (1974): Die Vogelwelt im Raum Andernach-Mayen-Cochem. Eine Gebietsavifauna der Eifel. *Beitr. Avifauna Rheinland* 3: 1-119.
- Bosselmann, J., G. Niethammer & H.E. Wolters (1971): Die Ausbreitung der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) im Rheinland. *Charadrius* 7: 90-96.

- Both, B., S. Bouwhuis, C.M. Lessells & M.E. Visser (2006): Climate change and population declines in a long-distance migratory bird. *Nature* 441: 81-83.
- Bottin, H., M. Bunzel & J. Drüke (1981): Nisthilfen für den Eisvogel. Ber. dtsh. Sekt. int. Rat Vogelschutz 21: 35-48.
- Bouillon, B. (2002): Rabenley-Kuckstein-Gebiet bei Bonn-Oberkassel. Staatliches Forstamt Eitorf, Untere Forstbehörde. Eitorf.
- Bradbury, R.B., A. Kyrkos, A.J. Morris, S.C. Clark, A.J. Perkins & J.D. Wilson (2000): Habitat associations and breeding success of yellowhammers on lowland farmland. *J. Appl. Ecol.* 37: 789-805.
- Bräsecke, R. (1997): Die Nilgans am Niederrhein. Jahrbuch Kreis Wesel 1997. Boss, Kleve: 152-156.
- Brambilla, M., F. Gidali & I. Negri (2008): The importance of an agricultural mosaic for Cirl Buntings *Emberiza cirius* in Italy. *Ibis* 150: 628-632.
- Braun, M. (2004): Neozoen in urbanen Habitaten: Ökologie und Nischenexpansion des Halsbandsittichs (*Psittacula krameri* SCOPOLI, 1769) in Heidelberg. Diplomarbeit Universität Heidelberg.
- Brickle, N.W. & D.G.C. Harper (2002): Agricultural intensification and the timing of breeding of Corn Buntings *Miliaria calandra*. *Bird Study* 49: 219-228.
- Brickle, N.W., D.G.C. Harper, N.J. Aebischer & S.H. Cockayne (2000): Effects of agricultural intensification on the breeding success of Corn Buntings *Miliaria calandra*. *J. Appl. Ecol.* 37: 742-755.
- Brombach, H. (1997): Der Rauchschwalbenbestand im Raum Leverkusen – Ein Vergleich nach 35 Jahren. *Charadrius* 33: 138-139.
- Brombach, H. (2000): Industrieunternehmen schaltet Lichtreklame zum Schutz von Zugvögeln ab. *Charadrius* 36: 131.
- Brombach, H. & H. Grieser (1977): Die Vogelwelt von Leverkusen. Beitr. Avifauna Rheinland 10.
- Browne, S.J. & N.J. Aebischer (2004). Temporal changes in the breeding ecology of European Turtle Doves *Streptopelia turtur* in Britain, and implications for conservation. *Ibis* 146: 125-137.
- Browne, S.J., N.J. Aebischer & H.Q.P. Crick (2005). Breeding ecology of Turtle Doves *Streptopelia turtur* in Britain during the period 1941-2000: an analysis of BTO nest record cards. *Bird Study* 52: 1-9.
- Broyer, J. (2003): Unmown refuge areas and their influence on the survival of grassland birds in the Saône valley (France). *Biodiversity Conservation* 12: 1219-1237.
- Brüggemann, T. (2009): Feldlerchenprojekt – 1000 Fenster für die Lerche. *Nat. NRW* 3/2009: 20-21.
- Brüggemann, T. (2010): Fast 9000 Fenster für die Feldlerche. *Nat. NRW* 1/2010: 29-31.
- Brune, J. (in Vorb.): Bestandsentwicklung des Rotmilans (*Milvus milvus*) von 1975 bis 2009 im MTB 4412 „Unna“.
- Brune, J. & A. Hegemann (2009): Verluste beim Rotmilan *Milvus milvus* durch illegale menschliche Eingriffe in den Landkreisen Unna und Soest (NRW) 1991– 2007, mit Hinweisen zur Feststellung wahrscheinlicher Verlustursachen. *Inf.dienst Nat.schutz Niedersachs.* 29: 192-198.
- Brune, J., E. Guthmann, M. Jöbges & A. Müller (2002): Zur Verbreitung und Bestandssituation des Rotmilans (*Milvus milvus*) in Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 38: 122-138.
- Brühne, M. & B. Gießing (2008): Stelzenläufer: Erfolgreiche Brut 2008 in Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 44: 124-125.
- BS & NABU Lippe [Biologische Station Lippe & NABU Kreisverband Lippe] (Hrsg.) (2008): Ornithologischer Sammelbericht 2007 für den Kreis Lippe. *Ornithol. Mitt.blatt Ostwestfalen-Lippe* 55/2007.
- Buchen, C. (1992): Erste Schwarzstorchbrut bei Morsbach 1991. *Berichtsh. Arb.gem. Bergisch. Ornithol.* 20: 29-30.
- Buchen, C. (1994): Zunahme des Saatkrähenbestandes im Oberbergischen Kreis seit 1980. *Charadrius* 30: 48-52.
- Buchen, C. (1998): Bestand des Schwarzstorchs (*Ciconia nigra*) nimmt zwischen Sieg und Bröl weiter zu. *Berichtsh. Arb.gem. Bergisch. Ornithol.* 31: 22.
- Buchen, C. (2005): Bestandsentwicklung des Schwarzstorchs *Ciconia nigra* im Mittelsieg-Bergland von 1991-2004. *Charadrius* 41: 84-86.
- Buchheim, A. (1996): Das Vorkommen der Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) in Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 32: 178-183.
- Buchheim, A. & J. Bellebaum (1993): Bruten des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) in NRW. *Charadrius* 29: 93-97.
- Bühning (1887): *Sylvia nisoria*, Bechst. – Sperbergrasmücke. In: Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft (Hrsg.): X. Jahresbericht (1885) des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. *J. Ornithol.* 35: 497.
- Bulk, E.-G., S. Bulk & E. Möller (2008): Kranich: Erster Brutnachweis in Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 44: 126-127.
- Bunkus, H. & E. Kretzschmar (1990): Erster Brutnachweis der Sturmmöwe (*Larus canus*) in Dortmund. *Dortmunder Faun. Mitt.* 2: 41-44.
- Bunzel, M. (1987): Der Eisvogel (*Alcedo atthis*) in Mittelwestfalen – Studien zu seiner Brutbiologie, Populationsbiologie, Nahrung und Siedlungsbiologie. Dissertation, Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
- Bunzel, M. & J. Drüke (1989): Kingfisher. In: Newton, I. (Hrsg.): Lifetime reproduction in birds: 107-116. Academic Press, London.
- Burghardt, S. (1989): Artenliste des Stadtkreises Mönchengladbach. NABU Mönchengladbach.
- Bußmann, D. & H. Rinsche (1990): Brutnachweis des Bienenfressers (*Merops apiaster* L. 1758) im Kreis Steinfurt. *Natur Heimat* 50: 45-46.
- Butler, C. (2002): Breeding parrots in Britain. *British Birds* 95: 345-348.
- Carboneras (1992): Family Anatidae (Ducks, geese and swans). In: del Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (Hrsg.): Handbook of the birds of the world. Vol. 1. Lynx Edicions, Barcelona: 536-628.
- Cardiel, I. (2006): El milano real en Espana. *II Censo Nacional 2004: SEO / BirdLife*. Madrid.
- Caspers, F.-J., H.P. Klein & H. Schwarthoff (1988): Die Vögel der Kläranlage „Escher Bürge“ im Kreise Düren. *Beitr. Avifauna Rheinland* 30: 1-161.
- Claessens, O. (1994): The situation of the Ortolan Bunting in France – present status, trend and possible causes of decrease. In: Steiner, H.M. (Hrsg.): I. Ortolan-Symp. Wien 1992: 123-128.
- Clarenbach, G. (1998): 8 Jahre Schwarzspechtbeobachtungen in der Haard. *Charadrius* 34: 159-164.
- Conrad, B., H. Klingner, H. Schulze-Wiehenbrauck & C. Stang (2002): Kormoran und Äsche – ein Artenschutzproblem. *Kriterienkatalog für regionales Konzept „Äschenhilfsprogramm“*. LÖBF-Mitteilungen 1/2002: 46-54.
- Conrads, K. (1957, unveröff.): Die Stadt als Lebensraum des Vogels. *Zur Avifauna der Brutvögel von Bielefeld und Bethel-Gadderbaum*. In: Bongards, H. & M. Bongards (Hrsg.) (2007): *Zur Avifauna der Brutvögel von Bielefeld und Bethel-Gadderbaum*. *Ber. Nat.wiss. Ver. Bielefeld* 47: 257-277.
- Conrads, K. (1967): Die Spechte in Westfalen-Lippe. *Ber. Nat.wiss. Ver. Bielefeld* 18: 25-113.
- Conrads, K. (1969): Beobachtungen am Ortolan (*Emberiza hortulana*) in der Brutzeit. *J. Ornithol.* 110: 379-420.
- Conrads, K. (1994): Dialektklassen des Ortolans im mittleren Europa – eine Übersicht. In: Steiner, H.M. (Hrsg.): I. Ortolan-Symposium 1992 in Wien, Wien: 5-30.
- Conrads, K. & M. Quelle (1981): Erster Brutnachweis des Bienenfressers (*Merops apiaster*) 1978 in Westfalen. *Ber. Nat.wiss. Ver. Bielefeld* 25: 83-80.
- Cramer (2000): Wildbestände ab 1848. In: Kreisjägerschaft Hochsauerland e. V. (Hrsg.): *Sauerländer Jäger, der Natur verbunden*. Arnsberg
- Creutz, G. (1988): Der Weißstorch. *NBB* 375. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt.
- Dachverband Biologische Stationen in NRW (2009): Die Biologischen Stationen in Nordrhein-Westfalen. <http://www.biostationen-nrw.org>, letzter Zugriff am 05.01.2012.
- Dachverband der Biologischen Stationen in NRW & LANUV (2011): 1000 Fenster für die Lerche – Ergebnisse der NRW-Erfolgskontrolle. *Nat. NRW* 1/2011: 20-23.
- Dalbeck, L. (2003): Der Uhu *Bubo bubo* (L.) in Deutschland – autökologische Analysen an einer wieder angesiedelten Population – Resümee eines Artenschutzprojekts. *Shaker Verlag, Aachen*.
- Dalbeck, L. (2005): Nahrung als limitierender Faktor für den Uhu *Bubo bubo* (L.) in der Eifel? *Ornithol. Anz.* 44: 99-112.
- Dalbeck, L., W. Bergerhausen & M. Hachtel (1999): Habitatpräferenzen des Steinkauzes *Athene noctua* Scopoli, 1769 im ortsnahen Grünland. *Charadrius* 35: 100-115.
- Degen, A. (2006): Rothals- (*Podiceps grisegena*) und Schwarzhalstaucher (*P. nigricollis*) in Niedersachsen: Verbreitung, Brutbestand und Habitatwahl 1995-2005 sowie Gefährdungsursachen, Schutz und Erhaltungszustand. *Vogelkdl. Ber. Niedersachs.* 38: 1-24.
- del Hoyo (1992): Family Phoenicopteridae (Flamingos). In: del Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (Hrsg.) (1992): Handbook of the birds of the world. Vol. 1. Lynx Edicions, Barcelona.
- Delany, S., D. Scott, T. Dodman & D. Stroud (Hrsg.) (2009): *An Atlas of Wader Populations in Africa and Western Eurasia*. Wetlands International. Wageningen, Niederlande.
- Demandt, C. (1970/71): Die Tragödie der westfälischen Wanderfalken. *Sauerländ. Naturbeobachter. Veröff. Nat.wiss.Ver. Lüdenscheld* 9: 15-22.
- Denker, E., A. Büthe, H. Knüwer, T. Langgemach, P. Lepom & I. Rühling (2001): Vergleich der Schadstoffbelastung in Eiern des Sperbers (*Accipiter nisus*) aus Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. *J. Ornithol.* 142: 49-62.
- Deutsch, A., S. Pleines, G. Sennert & K. Hubatsch (1996): Die Heringsmöwe (*Larus fuscus*) als Sommergast in NRW. *Charadrius* 32: 206-219.
- Devillers, P., W. Roggeman, J. Tricot, P. del Marmol, C. Kerwijn, J.-P. Jacob & A. Anselin (Hrsg.) (1988): *Atlas des oiseaux nicheurs de Belgique*. Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Brüssel.
- Devrient, I. & R. Wohlgemuth (1992): Verhaltensbeobachtungen bei Baumfalken (*Falco subbuteo*) mit Bruten auf Freileitungsmasten. *Charadrius* 28: 167-171.
- Dick, G., M. Dvorak, A. Grüll, B. Kohler & G. Rauer (1994): *Vogelparadies mit Zukunft, Ramsar-Gebiet Neusiedler See – Seewinkel*. Umweltbundesamt, Wien.

- Dinter, W. (1999): Naturräumliche Gliederung. In: LÖBF/LaFAO NRW (Hrsg.) Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in NRW. 3. Fassung, LÖBF-Schriftenreihe 17: 29-36.
- Dittberner, H. & W. Dittberner (1984): Die Schafstelze *Motacilla flava*. NBB 559. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt.
- Döhring, W. (2003): Haubenlerche in Dormagen. Unveröff. Manuskript.
- Doer, D. (2011): Das Vorkommen des Schwarzmilans *Milvus migrans* als Brut- und Rastvogel am Niederrhein. Charadrius 47: 150-160.
- Doer, D., A. Barkow, V. Wille & S.R. Sudmann (2009): Der „Untere Niederrhein“: international bedeutsames Feuchtgebiet, Important Bird Area und EU-Vogelschutzgebiet. Charadrius 45: 185-198.
- Doer, D., A. Barkow, M. Hertel & H.-J. Windeln (2010): Neues aus der Natur im Kreis Kleve. Nat.schutz Kreis Kleve 2/2010: 22-23.
- Doer, D., V. Wille & A. Barkow (2011): Warum Wiesenvogelschutz häufig erfolglos ist – Beispiele aus dem Naturschutzgebiet „Düffel, Kellener Altrhein und Flussmarschen“ (Kreis Kleve). Charadrius 47: 175-195.
- Donald, P.F. & A.D. Evans (1994): Habitat selection by Corn Buntings *Miliaria calandra* in winter. Bird Study 41: 199-210.
- Dornbusch, M. (1993): Zur Situation der Schwarzstörche in Mitteleuropa. „Internationale Weißstorch- und Schwarzstorch-Tagung im Kreis Minden-Lübbecke, 1992, Tagungsband 1993: 47-48.
- Dornbusch, G. (2005): Zur Bestandsentwicklung des Schwarzstörchs *Ciconia nigra* in Deutschland. Charadrius 41: 76-80.
- Drost, R. (1955): Wo verbleiben im Binnenland frei aufgezogene Nordsee-Silbermöwen? Vogelwarte 18: 85-93.
- Drost, R. (1958): Über die Ansiedlung von jung ins Binnenland verfrachteter Silbermöwen (*Larus argentatus*). Vogelwarte 19: 169-173.
- DSK [Deutsche Seltenheitenkommission] (1994): Seltene Vogelarten in Deutschland 1991 und 1992. Limicola 8: 153-209.
- Dürr, T. (2011): Zur Gefährdung von Wiesenweihen durch Windenergieanlagen. Onlineversion vom 19.01.2011 (<http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.206060.de>).
- Dürr, T. (2012): http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.2334.de/wka_vogel_de.xls.
- Düsterhaus, B. (1992): Explosionsartige Bestandsentwicklung des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) 1991 in den Höhenlagen des Schmallenberger Sauerlandes. Charadrius 28: 142-146.
- Düsterhaus, B. (1995): Erster Brutnachweis der Ringdrossel (*Turdus torquatus* L.) in Nordrhein-Westfalen. Charadrius 31: 133-136.
- DVBS & LANUV [Dachverband der Biologischen Stationen und Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, bearbeitet von R. Joest, L. Dalbeck, C. Oberwelland, M. Olthoff, K. Nottmeyer, B. Walter & J. Weiss] (2011): 1000 Fenster für die Lerche – Ergebnisse der NRW Erfolgskontrolle. Nat. NRW 1/2011: 20-23.
- Dvorak, M., H. Ranner & H.-M. Berg (1991): Atlas der Brutvögel Österreichs. Umweltbundesamt, Wien.
- Eber, G. (1966): Der Saatkrähenbestand im Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1956-1965. Abh. Westf. Landesmus. Nat.kd. 28 (2): 1-32.
- Eber, G. (1967/68): Die Brutvögel des Teichröhrichts an den Krickenbecker Seen. Niederrhein. Jahrb. 10: 79-84.
- Eber, G. (1968a): Die wichtigsten Wasservogelgebiete in Nordrhein-Westfalen. Anthus 5: 41-108.
- Eber, G. (1968b): Der Saatkrähenbestand im Nordrhein-Gebiet von 1965-1967. Charadrius 4: 32-39.
- Eber, G. (1968c): Brutvogelbestandsaufnahmen im Naturschutzgebiet „Emsdettener Venn“ – Ein Beitrag zur Diskussion über quantitative Erfassungsmethoden. Schriftenr. Landesst. Naturschutz u. Landschaftspflege NRW 5: 83-124.
- Eber, G. (1973): Dokumentation der 6jährigen Schwimmvogelzählung in Nordrhein-Westfalen von 1966-1972. Anthus 10: 49-75.
- Eber, G. & C. Schäfer (1973): Das Zwillbrocker Venn – Ein Naturschutzgebiet in Vreden. Eigenverlag, Vreden.
- Eberhard, D. & H. Mildnerberger (1971): Bestandsschwankungen einiger Brutvögel am unteren Niederrhein. Charadrius 7: 105-113.
- Egidi, R. (1985): Erhaltung des Haselhuhns aus forstlicher Sicht. LÖLF-Mitt. 3/1985: 43.
- Ehrenbold, S. (2010): Schleioreule *Tyto alba* vertreibt junge Turmfalken *Falco tinnunculus* aus Nistkasten. Eulen-Rd.blick 60: 84.
- Ehrlich, P., D. Dobkin & D. Wheye (1988): The Birders Handbook. New York.
- Eikhorst, W. & J. Bellebaum (2004): Prädatoren kommen nachts – Gelegetverluste in Wiesenvogelschutzgebieten Ost- und Westdeutschlands. In: Krüger, T. & P. Südbeck (Hrsg.): Wiesenvogelschutz in Niedersachsen. Nat.schutz Landsch.pfl. Niedersachs. 41: 81-89.
- Eislöffel, F. (1992): Baumbrütende Mauersegler (*Apus apus*) im Hunsrück. Fauna Flora Rheinl.-Pfalz 6: 1167-1168.
- Ellenberg, H. (1986): Warum gehen Neuntöter (*Lanius collurio*) in Mitteleuropa im Bestand zurück? Überlegungen zu den Auswirkungen von Pestiziden sowie zu den Landschaftsveränderungen im Winterquartier und im Brutgebiet. Corax 12: 34-46.
- Ellenberg, H. & R. Dreifke (1992): Abrition – Der Kolkrabe als Schutzschild vor dem Habicht. Corax 15: 2-10.
- Elsner, J. & M. Abs (2001): Zum Bestand frei lebender Haussperlinge (*Passer domesticus* L.) in zwei zoologischen Gärten des Ruhrgebietes. Charadrius 37: 23-33.
- Engländer, H. (1984): Artenhilfsprogramm Flußseeschwalbe. In: LÖBF NW (Hrsg.): Naturschutz praktisch – Beiträge zum Artenschutzprogramm NW: Merkblätter zum Biotop- und Artenschutz Nr. 64.
- Engländer, H. (1991): Die Vogelwelt des Bienener Altrheins und seiner Umgebung im Verlauf von 4 Jahrzehnten. Nat. Landsch. 66: 149-151.
- Engländer, H. & A.G. Johnen (1964): Ausbreitung und Ansiedlung der Reiher- und Tafelente am unteren Niederrhein. Decheniana 116: 83-91.
- Engländer, H. & D. Prestel (1993): 51. Ornithologischer Sammelbericht für das Rheinland, Zeitabschnitt 16.3.1992-15.9.1992. Charadrius 29: 31-34.
- Engländer, H. & H. Weitz (1982): 30. Ornithologischer Sammelbericht für das Rheinland vom 16.3.-15.9.1981. Charadrius 17: 52-64.
- Engländer, H., D. Prestel & P. Schnitzler (1989): 44. Ornithologischer Sammelbericht für das Rheinland. Charadrius 25: 127-133.
- Engländer, H., S. Frick & D. Prestel (1994): 53. Ornithologischer Sammelbericht für das Rheinland, Zeitabschnitt 16.3.1993-15.9.1993. Charadrius 30: 53-56.
- Engländer, H., S. Frick & D. Prestel (1995): 55. Ornithologischer Sammelbericht für das Rheinland, Zeitabschnitt 16.3.1994-15.9.1994. Charadrius 31: 84-90.
- Engländer, H., S. Frick & A. Glinka (1996): 57. Ornithologischer Sammelbericht für das Rheinland, Zeitabschnitt 16.3.1995-15.9.1995. Charadrius 32: 29-34.
- Engler, H. (1980): Die Teichralle. NBB 536. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt.
- Engler, H. (1999): Bemerkungen zur Bestandsentwicklung der Teichralle in Deutschland. Ornithol. Mitt. 51: 98-103.
- Engler, H. (2003): Zum Brutbestand der Teichralle (*Gallinula chloropus*) in Deutschland. Eine quantitative Übersicht. Ornithol. Mitt. 55: 183-186.
- Engler, B. & H.-G. Bauer (2002): Dokumentation eines starken Bestandsrückgangs beim Haussperling (*Passer domesticus*) in Deutschland auf Basis von Literaturangaben von 1850-2000. Vogelwarte 41: 196-210.
- Eppl, W. (1997): Zum Schutz der Rabenvögel. Inf.dienst Nat.schutz Niedersachs. 17: 198-214.
- Eraud, C., J.-M. Boutin, M. Riviere, J. Brun, C. Barbraud & H. Lormee (2009): Survival of Turtle Doves *Streptopelia turtur* in relation to western Africa environmental conditions. Ibis 151: 186-190.
- Erhard, R. (1976): Zur Invasion des Fichtenkreuzschnabels (*Loxia curvirostra* L.) 1974/75 im Rheinland. Charadrius 12: 49-57.
- Erhard, R. & M. Wink (1991): Entwicklung der Vogelpopulationen im Großraum Bonn (1975-1990). Charadrius 27: 113-123.
- Ernst, U. (1995): Papageien vor der Haustür. Afro-asiatische Sittiche in einer mitteleuropäischen Großstadt: Einnischung und Auswirkungen auf die Avifauna. Jahrb. Papageienkd. 1: 23-114.
- Ernst, S. (1998): Die Birkenzeisige Birkenzeisig und Polarbirkenzeisig *Carduelis flammae*, *Carduelis hornemanni*. Verlag der Buchhandlung Klingenthal, Klingenthal.
- Erz, W. (1960): Über die verwilderten Haustauben in Dortmund. Ornithol. Mitt. 12: 151-152.
- Erz, W. (1967): Bestand und Siedlungsdichte von Mäusebussard, Habicht und Sperber in Nordrhein-Westfalen. Charadrius 3: 205-214.
- Erz, W. (1968): Quantitativ-ornithologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet „Wahner Heide“ nebst methodischen Erörterungen. Beitr. angewandte Vogelkd. 5: 137-166.
- Erz, W. (1979): Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Vogelarten (Aves). In: Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung NW (Hrsg.): Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Pflanzen und Tiere. Schriftenr. LÖLF NW, Bd. 4: 38-45. Recklinghausen.
- Esser, J., M. Fuhrmann & C. Venne (2010): Rote Liste und Gesamtartenliste der Wildbienen und Wespen (Hymenoptera: Apidae, Crabronidae, Sphecidae, Ampulicidae, Pompilidae, Vespidae, Tiphiidae, Sapygidae, Mutillidae, Chrysididae) Nordrhein-Westfalens. Ampulex 2: 5-60.
- Ewerings, T. (1968): Die Ansiedlung der Sturmmöwe (*Larus canus*) in den Rhein-Lippe-Ölhäfen bei Wesel. Charadrius 4: 24-28.
- Ewerings, T., H. Mildnerberger & W. Müller (1978): Die Brutbestände der Sturmmöwe (*Larus canus*) am unteren Niederrhein von 1968 bis 1977. Charadrius 14: 33-35.
- Ewers, C., K. Schmidt & J. Weiss (2000): Das Pilotprojekt „Haselhuhn“ (*Bonasa bonasia*) im Siegerland. Forst Holz 55: 76-79.
- Eylert, J. (2003): Rebhuhn-Monitoring in NRW. LÖBF-Mitt. 2/2003: 52-56.
- Eylert, J. & T. Lange (2006): Förderprogramm „Artenreiche Feldflur“ – Erfolg auf dem Acker. LÖBF-Mitt. 4/2006: 38-42.
- Feldmann, R. (1963): Der Uhu in Westfalen. Natur und Heimat 23: 19-26.

- Feldmann, B. & A. Klein (2010): Brutvögel der Rieselfelder 2009. In: Biologische Station „Rieselfelder Münster“ (Hrsg.): Jahresber. 2009 der Biologischen Station „Rieselfelder Münster“: 21-23.
- Feldmann, B. & A. Klein (2011): Brutvögel der Rieselfelder. In: Biologische Station „Rieselfelder Münster“ (Hrsg.): Jahresber. 2010 der Biologischen Station „Rieselfelder Münster“: 66-70.
- Feldmann, R. & W. Stichmann (1986): Geographisch-Landeskundlicher Atlas von Westfalen. Begleittext zum Doppelblatt „Verbreitung wildlebender Tiere“. Münster (Aschendorf): 1-10.
- Fellenberg, W. (1971): Erste Nachweise von Stadtbruten der Tannenmeise in Westfalen. *Anthus* 8: 52-54.
- Fellenberg, W. (1972): Die Entwicklung der sauerländischen Tannenhäherpopulation. *Nat. Heimat* 32: 120-123.
- Fellenberg, W. (1981a): Ausbreitung des westfälischen Brutpopulation der Reiherente (*Aythya fuligula*) ins Südwestfälische Bergland. *Charadrius* 17: 48-49.
- Fellenberg, W. (1981b): Der Birkenzeisig (*Carduelis flammea*) Brutvogel in Westfalen. *Charadrius* 17: 22-27.
- Fellenberg, W. (1984a): Nachweise von Außennestern der Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*). *Charadrius* 20: 33-35.
- Fellenberg, W. (1984b): Die Entwicklung der westfälischen Brutpopulation des Birkenzeisigs (*Carduelis flammea cabaret*) 1981-1983. *Charadrius* 20: 246-251.
- Fellenberg, W. (1986): Die Invasion des Fichtenkreuzschnabels (*Loxia curvirostra*) 1983 in Westfalen und die weitere Bestandsentwicklung bis Ende 1985 (mit einem Rückblick auf die Vorjahre). *Charadrius* 22: 199-215.
- Fellenberg, W. (1988): Erste Nachweise des Karmingimpels (*Carpodacus erythrinus*) in Westfalen. *Charadrius* 24: 85-87.
- Fellenberg, W. (1989): 19. Ornithologischer Sammelbericht für Westfalen. *Charadrius* 25: 99-108.
- Fellenberg, W. (1991): 23. Ornithologischer Sammelbericht für Westfalen. *Charadrius* 27: 88-96.
- Fiedler, G. (1992): Verluste an Freileitungen durch Stromschlag und Anflug. *Schriftenr. Umwelt Nat.schutz Kreis Minden-Lübbecke* 2: 45-46.
- Fischer, S. (1994): Einfluß der Witterung auf den Bruterfolg des Drosselrohrsängers *Acrocephalus arundinaceus* am Berliner Müggelsee. *Vogelwelt* 115: 287-292.
- Fischer, W. (1995): Die Habichte. NBB 158, 3. Aufl. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt.
- Fischer, S. & R. Schneider (1996): Die Grauwammer *Emberiza calandra* als Leitart der Agrarlandschaft. *Vogelwelt* 117: 225-234.
- Fiuczynski, D. (1987): Der Baumfalke. NBB 575. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt.
- Flade, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands: Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. IHW-Verlag; Eching.
- Flade, M. (1997): Wo lebte der Wachtelkönig in der Urlandschaft? *Vogelwelt* 118: 141-146.
- Flade, M. & J. Schwarz (2004): Ergebnisse des DDA-Monitoringprogramms, Teil II: Bestandsentwicklung von Waldvögeln in Deutschland. *Vogelwelt* 125: 177-213.
- Flade, M., D. Franz & A. Helbig (1986): Die Ausbreitung der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze bis 1985. *J. Ornithol.* 127: 261-287.
- Flade, M., C. Sudfeldt, K. Dziewiaty, H. Hötter, J. Hoffmann, P. Bernady, J.D. Ludwigs, R. Jost, T. Langgemach, L. Achilles, H. Rümker, R. Tüllinghoff, B. Giessing, M. Kramer, S. Trautmann & M. Dankelmann (2011): Positionspapier zur aktuellen Bestandssituation der Vögel der Agrarlandschaft. *Vogelkd. Ber. Niedersachs.* 42: 175-184.
- Flinks, H. & F. Pfeifer (1984): Zur Verbreitung und Populationsentwicklung des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata*) in Nordrhein-Westfalen. *Vogelwelt* 105: 41-51.
- Flinks, H. & F. Pfeifer (1987a): Brutzeit, Gelegegröße und Bruterfolg beim Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*). *Charadrius* 23: 128-140.
- Flinks, H. & F. Pfeifer (1987b): Nahrung adulter und nestjunger Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*) einer westfälischen Brutpopulation. *Vogelwelt* 108: 41-57.
- Flinks, H. & F. Pfeifer (1993): Vergleich der Habitatemente ehemaliger und aktueller Schwarzkehlchen- (*Saxicola torquata*) Brutplätze in einer agrarisch genutzten Landschaft. *Ökol. Vögel* 15: 85-97.
- Floericke, K. (1907): Deutsches Vogelbuch. Kosmos-Verlag, Stuttgart.
- Flore, B.-O. (2011): Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis* am Alfsee: Brut- und Gastvögel an einem nordwestdeutschen Flachsee mit Massenvorkommen von Nuttals Wasserpest *Elodea nuttallii*. *Vogelwelt* 132: 197-206.
- Foit, G. (1987): Graureiher (*Ardea cinerea*) verdingt sich in Hochspannungsleitung. *Charadrius* 23: 251.
- Foppen, R., C.J.F. ter Braak, J. Verboom & R. Reijnen (1999): Dutch Segdewarblers (*Acrocephalus schoenobaenus*) and West-African rainfall: empirical data and simulation modelling show low population resilience in fragmented marshlands. *Ardea* 87: 113-127.
- Fox, S.D., B.S. Ebbinge, C. Mitchell, T. Heinicke, T. Aarvak, K. Colhoun, P. Clausen, S. Dereliev, S. Faragó, K. Koffijberg, H. Kruckenberg, M.J.J.E. Loonen, J. Madsen, J. Mooij, P. Musil, L. Nilsson, S. Pihl & H. van der Jeugd (2010): Current estimates of goose population sizes in western Europe, a gap analysis and an assessment of trends. *Ornis Svecica* 20: 115-127.
- Francois, R. (2002): Aantalsevolutie en gedrag van dakbroedende Zilvermeeuwen *Larus argentatus* en Kleine Mantelmeeuwen *Larus fuscus* in België. *Natuur.oriolus. Themanummer Meeuwen* 68: 123-126.
- Frank, H. (1970): Über die Einbürgerung von Wildputen. *Finnish Game Research* 30: 382-386.
- Franken, F. (1996): Brutversuch des Schwarzmilans (*Milvus migrans*) im Naturschutzgebiet Krickenbecker Seen (Kreis Viersen). *Charadrius* 32: 82-83.
- Franz, A. (1985): Niedergang einer lokalen Haselhuhnpopulation. *LÖLF-Mitt.* 3/1985: 42.
- Franz, D. (1998): Das Blaukehlchen: von der Rarität zum Allerweltsvogel? Aula-Verlag, Wiesbaden.
- Franz, A. & J. Sator (1979): Die Vögel des Siegerlandes. Neunkirchen.
- Franz, D. & T. Krause (2003): Biologie und Verbreitung des Halsbandsittichs in Deutschland. Teile 1 + 2. *Papageien* 5/2003: 163-167 und 6/2003: 209-213.
- Franz, A., T. Mebs & E. Seibt (1984): Zur Populationsbiologie des Rauhußkauzes (*Aegolius funereus*) im südlichen Westfalen und in angrenzenden Gebieten anhand von Beringungsergebnissen. *Vogelwarte* 32: 260-269.
- Freeman, S.N. & H.Q.P. Crick (2003): The decline of the Spotted Flycatcher *Muscicapa striata* in the UK: an integrated population model. *Ibis* 145: 400-412.
- Frey, P. (1948): Die Vogelfauna von Leverkusen und Umgebung. Eigenverlag, Leverkusen.
- Frick, S., A. Kahl-Dunkel & S.R. Sudmann (2005): Kölner Vogelwelt. Unveröff. Manuskript.
- Friedrichs, T. (2011): Die Graugans *Anser anser* als regelmäßiger Baumbrüter. *Apus* 16: 29-40.
- Fuchs, F.-J. & T. Macke (1997): Die Zippammer (*Emberiza cia*) im Ahrtal. Unveröff. Manuskript.
- Gaedicke, L. & J. Wahl (2007): Für ADEBAR auf den „Schneppenstrich“ – Anregung zur Ermittlung von Waldschneppenbeständen bei Atlaskartierungen. *Charadrius* 43: 38-45.
- Gaedicke, L., H. Lauruschkus & J. Wahl (2009): Ornithologischer Jahresbericht für Münster 2008. Online-Veröffentlichung: www.msorni.de.
- Gaedicke, L., H. Lauruschkus & J. Wahl (2010): Ornithologischer Jahresbericht für Münster 2009. Online Veröffentlichung: www.msorni.de.
- Gamauf, A. (1999): Der Wespenbussard (*Pernis apivorus*) ein Nahrungsspezialist? Der Einfluß sozialer Hymenopteren auf Habitatnutzung und Home Range-Größe. *Egretta* 42: 57-85.
- Gantlett, S. (2010): Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*. *Birding World* 23: 231.
- Garling, B. (1987): Beobachtungen zum Vorkommen und über die Brutbiologie und Nahrung des Gelbspötters (*Hippolais icterina*). *Charadrius* 23: 62-65.
- Garniel, A., W.D. Daunicht, U. Mierwald & U. Ojowski (2007): Vögel und Verkehrslärm. Quantifizierung und Bewältigung entscheidungserheblicher Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Avifauna. Schlussbericht November 2007 / Kurzfassung. – FuEVorhaben 02.237/2003/LR des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung. Bonn, Kiel.
- Garthe, S., B.-O. Flore, B. Hälterlein, O. Hüppop, U. Kubetzki & P. Südbeck (2000): Brutbestandsentwicklung der Möwen (Laridae) an der deutschen Nordseeküste in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. *Vogelwelt* 121: 1-13.
- Gasow, H. (1953): Vom Rauhußkauz in Westfalen. *Nat. Heimat* 13: 106-111.
- Gasow, H. (1956): Bemerkenswerte Vogelarten aus dem Siegerland (Tannenhäher, Grauspecht u. Wellenläufer. *Nat. Heimat* 16: 23-24.
- Gasow, H. (1964): Beitrag zur Kenntnis des Rauhußkauzes (*Aegolius funereus*): Brutvorkommen und Ansiedlung in Südwestfalen, biologische Daten. *Schriftenr. Landesstelle Nat.schutz Landsch.pfl. NRW* 1: 41-62.
- Gaßling, K.-H. (1983): Zur Verbreitung und Bestandsentwicklung der Uferschnalbe (*Riparia riparia*) in den linksrheinischen Teilen der Kreise Kleve und Wesel. *Beih. Veröff. Nat.schutz Landsch.pfl. Bad.-Württ.* 37: 53-60.
- Gaßling, K.-H. (1989): Erste erfolgreiche Bruten beim Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) und beim Graureiher (*Ardea cinerea*) in Rheinberg (Kreis Wesel). *Charadrius* 25: 33-34.
- Gatter, W. (2000): Vogelzug und Vogelbestände in Mitteleuropa. Aula-Verlag, Wiebelsheim.
- Gatter, W. (2004): Deutschlands Wälder und ihre Vogelgesellschaften im Rahmen von Gesellschaftswandel und Umwelteinflüssen. *Vogelwelt* 125: 151-176.

- Gatter, W. & H. Mattes (2008): Ändert sich der Mittelspecht *Dendrocopos medius* oder die Umweltbedingungen? Eine Fallstudie aus Baden-Württemberg. *Vogelwelt* 129: 73-84.
- Gedeon, K., A. Mitschke & C. Sudfeldt (2004a): Atlas Deutscher Brutvogelarten – Dessauer Tagung gab Startschuss für 2005. *Vogelwelt* 125: 123-135.
- Gedeon, K., A. Mitschke & C. Sudfeldt (2004b): Brutvögel in Deutschland. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland.
- Geesink, B. & T. Willers (1973): Brut des Schwarzhalstauchers (*Podiceps nigricollis*) im Zwillbrocker Venn. *Anthus* 10: 92.
- Gehle, T. (2009): Wo sind die Fasane geblieben. *Rheinisch-Westfälischer Jäger* 63 (5): 7-9.
- Geissels, H. (1984): Die Auswirkungen einer Flurbereinigung auf den Brutbestand von Schwalben in Wachtendonk, Krs. Kleve. *Charadrius* 20: 28-32.
- Geiter, O., S. Homma & R. Kinzelbach (2002): Bestandsaufnahme und Bewertung von Neozoen in Deutschland. Forschungsbericht 296 89 901/01, UBA-FB 000215, BMU.
- Gelmroth, K. (1992): Stadtauben. *Natur- Tierschutz Dortmund* 7 (2): 11-18.
- Gelmroth, K. (1996): Stadtauben – geliebt und gehasst. *Natur- Tierschutz Dortmund* 11 (2): 4.
- George, K. (1996a): Deutsche Landwirtschaft im Spiegel der Vogelwelt. *Vogelwelt* 117: 187-198.
- George, K. (1996b): Habitatnutzung und Bestandssituation der Wachtel *Coturnix coturnix* in Sachsen-Anhalt. *Vogelwelt* 117: 205-211.
- George, K. (2000): Zum Vorkommen des Erlenzeisigs (*Carduelis spinus*) im Unterharz. *Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum* 18: 83-92.
- George, K. (2005): Mehrjährige Untersuchungen an Sumpfmehsen (*Parus palustris*), Weidenmehsen (*Parus montanus*) und Tannenmehsen (*Parus ater*) im Harz. *Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum* 23: 53-72.
- Geyr von Schweppenburg, H. Freih. (1960): *Motacilla flava* wurde Feldvogel. *J. Ornithol.* 101: 282-285.
- Gibbons, D.W., J.B. Reid & R.A. Chapman (1993): The new atlas of breeding birds in Britain and Ireland: 1988-1992. T&AD Poyser, London.
- Giehr, V. (1987): Erfolgreiche Brut des Stelzenläufers im NSG Rieselfelder Nottuln-Appelhülsen. *Kiebitz* 6: 151-153.
- Gießing, K. & B. Gießing (2011): Avifaunistisches Gutachten zum Gebiet *Altrhein Bienen-Praest* 2011 (Brutvögel). Unveröff. Gutachten im Auftrag des LANUV NRW.
- Gießing, B. & S.R. Sudmann (1994): Ausbreitung der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) im nördlichen Rheinland. *Charadrius* 30: 166-172.
- Giller, F. (1967): Zur Einwanderung und Ansiedlung der Sturmmöwe (*Larus canus*) im linksrheinischen Braunkohlengebiet. *Charadrius* 3: 21-24.
- Giller, F. (1976): Die Avifauna des Rheinischen Braunkohlengebietes. *Beitr. Avifauna Rheinland* 7/8. Düsseldorf.
- Gliemann, L. (1973): Die Grauammer *Emberiza calandra*. NBB 443. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt.
- Glimm, D. & W. Prünke (1989): Rohrweihe *Circus aeruginosus*. In: Illner, H., W. Lederer & K.-H. Loske (Hrsg.): Atlas der Brutvögel des Kreises Soest/ Mittelwestfalen 1981-1986. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest, Bad Sassendorf: S. 72-73.
- Glimm, D., M. Hölker & W. Prünke (2001): Brutverbreitung und Bestandsentwicklung der Wiesenweihe in Westfalen. *LÖBF-Mitt* 2/2001: 57-68.
- Glinka, A. & C. Wolf (1994): Zur Brutbiologie des Austernfischers (*Haematopus ostralegus*) am Unteren Niederrhein. *Charadrius* 30: 141-151.
- Glinka, S., E. Kretschmar & A. Müller (1998): 3. Ornithologischer Sammelbericht für Nordrhein-Westfalen, Zeitabschnitt 1.3.1997-30.8.1997. *Charadrius* 34: 32-46.
- Gluer, B., F. Prünke & W. Prünke (1990): Gehäuftes Brüten des Baumfalken (*Falco subbuteo*) auf Freileitungsmasten. *Charadrius* 26: 146-150.
- Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer (Hrsg.) (1980): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 9. Akademie-Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
- Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer (Hrsg.) (1988): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 11. Aula-Verlag, Wiesbaden.
- Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer (Hrsg.) (1991): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 12. Aula-Verlag, Wiesbaden.
- Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer (Hrsg.) (1993): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 13. Aula-Verlag, Wiesbaden.
- Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer (Hrsg.) (1997): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 14. Aula-Verlag, Wiesbaden.
- Glutz von Blotzheim, U.N., K.M. Bauer & E. Bezzel (Hrsg.) (1973): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 5. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt/Main.
- Glutz von Blotzheim, U.N., K.M. Bauer & E. Bezzel (Hrsg.) (2001): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. eBook-Lizenz Ausgabe. Vogelzug-Verlag, Wiebelsheim.
- Gnielka, R. (1987): Der Bestand des Ortolans im Bezirk Halle. *Apus* 6: 273-279.
- Gössling, A. (1968): Siedlungsdichteuntersuchungen und Zugbewegungen in einem Wiesengebiet bei Vermold („Vermolder Bruch“), Kreis Halle. Examensarbeit PH Bielefeld.
- Goethe, F. (1991): Sturmmöwe *Larus canus*. In: Zang, H., G. Großkopf & H. Heckenroth (Hrsg.): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen – Raubmöwen bis Alken. *Nat.schutz Landsch.pfl. Niedersachs. Sonderreihe B, H. 2.6*: 81-91.
- Götte, R. (2009): Brutnachweis des Wachtelkönigs *Crex crex* im Hochsauerlandkreis. *Charadrius* 45: 225-226.
- Gossel, W. & M. Kuhn (2009): Haubentaucher *Podiceps cristatus* verfüttern Neozoen-Krebse. *Charadrius* 45: 62-68.
- Gottschling, M. (2004): Zur Entstehung eines Hybriden Stockente x Kolbenente (*Anas platyrhynchos* x *Netta rufina*) im Freiland. *Charadrius* 40: 171-176.
- Grauer, A., G. Greiser, R. Keuling, E. Strauß, L. Wenzelides & A. Winter (2008): Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands. Status und Entwicklung ausgewählter Wildtierarten in Deutschland, Jahresber. 2008. Deutscher Jagdschutz-Verband e.V. (Hrsg.), Bonn.
- Green, R.E., G. Rocamora & N. Schäffer (1997): Populations, ecology and threats to the Corncrake *Crex crex* in Europe. *Vogelwelt* 118: 117-134.
- Gries, B., H. Hötker, G. Knoblauch, J. Peitzmeier, H.O. Rehage & C. Sudfeldt (1979): Anhang zu Avifauna von Westfalen. *Abh.Westf. Landesmus. Nat. kd.* 41: 477-576.
- Griesenbrock, B. (2006): Habitat und Nistplatzwahl der Wiesenweihe *Circus pygargus* in der Hellwegbörde. Diplomarbeit Universität Münster.
- GRO & WOG [Gesellschaft Rheinischer Ornithologen & Westfälische Ornithologen-Gesellschaft] (1986): Rote Liste der gefährdeten Vogelarten NRW. *Charadrius* 22: 177-184.
- GRO & WOG [Gesellschaft Rheinischer Ornithologen & Westfälische Ornithologen-Gesellschaft] (1997): Rote Liste der gefährdeten Vogelarten NRW. *Charadrius* 33: 69-116.
- Groh, G. (1975): Zur Biologie der Zauammer (*Emberiza cirulus*, L.) in der Pfalz. *Mitteilungen der Pollichia* 63: 72-139.
- Grüneberg, C. & J. Melter (2001): Monitoring der Rast- und Schlafplatzbestände von Uferschnepfen *Limosa limosa* in den Rieselfeldern Münster. *Vogelwelt* 122: 29-39.
- Grüneberg, C. & H. Schielzeth (2005): Verbreitung, Bestand und Habitatwahl des Kiebitzes *Vanellus vanellus* in NRW: Ergebnisse einer landesweiten Erfassung 2003/2004. *Charadrius* 41: 178-190.
- Grünhagen, H. (1985): Ist die Ausbreitung der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) in den Nordwesten des Niederrheinischen Tieflandes zum Stillstand gekommen? *Charadrius* 21: 65-67.
- Grünhagen, H. (1993): Sperberbruten in Krefelder Gärten. *Charadrius* 29: 64-74.
- Grünhagen, H. & B. Lavendel (2009): Stadtabichte in Duisburg und Krefeld. *Ornithol. Mitt.* 61: 242-245.
- Grützmann, J., V. Moritz, P. Südbeck & D. Wendt (2002): Ortolan (*Emberiza hortulana*) und Grauammer (*Miliaria calandra*) in Niedersachsen: Brutvorkommen, Lebensräume, Rückgang und Schutz. *Vogelkd. Ber. Niedersachs.* 34: 69-90.
- Grunden, T. (1975): Bartmehsen (*Panurus biarmicus*) – Beobachtungen im Rheinland von 1965 bis 1973. *Charadrius* 11: 46-50.
- Güth, K. (1974): Erst-Brutnachweis der Bartmeise (*Panurus biarmicus*) für Westfalen bei Rietberg. *Alcedo* 1: 70.
- Güth, K. (1985): Erster Brutnachweis der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) in Westfalen. *Ornithol. Mitt.* 37: 79.
- Guthmann, E. (2004): Höchste Mäusebussarddichte in NRW auf einer TK25 im westlichen Bergischen Land. *Berichtsh. Arb.gem. Bergisch. Ornithol.* 45: 6-7.
- Guthmann, E., D. Ackermann, T. Mebs, G. Müskens & J. Thissen (2005): Bestandsentwicklung und Bruterfolg des Mäusebussards *Buteo buteo* in NRW von 1974-2003. *Charadrius* 41: 161-177.
- Güthörl, V. (2006): Zum Einfluss des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) auf Fischbestände und aquatische Ökosysteme – Fakten, Konflikte und Perspektiven für kulturlandschaftsgerechte Wildhaltung. *Wildland Weltweit Verlag, Rolbing, Frankreich.*
- Haafke, J. (1983): Die Bestandsentwicklung des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) an einem neubesiedelten Gewässer. *Charadrius* 19: 205-219.
- Hackstein, M. (2009): Die Feldvogelgemeinschaft des rekultivierten Tagebaus Fortuna-Garsdorf im Rheinischen Braunkohlenrevier. Diplomarbeit Universität Münster.
- Härtel, H. (1998): Zur Bestandsentwicklung der großen Spechtarten im südlichen Ostwestfalen (Kreis Paderborn). *Charadrius* 34: 136-138.
- Härtel, H. (2002): Die Singvögel in Bielefeld und seinem Umland. *Ber. Nat. wiss. Ver. Bielefeld* 42: 5-66.
- Haffer, J. (1997): Zauammer (*Emberiza cirulus*). In: Glutz von Blotzheim U.N. & K.M. Bauer (Hrsg.): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 14: 1485-1518. Aula-Verlag, Wiesbaden.

- Hagemeyer, W.J.M. & M.J. Blair (Hrsg.) (1997): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T & AD Poyser, London.
- Hamann, M. (1988): Brutverbreitung des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in Gelsenkirchen im Jahr 1987 und Vorschläge für ein Artenschutzkonzept. *Charadrius* 24: 61-66.
- Hamann, M. (1991): Die Bedeutung von Industriebrachflächen für die Avifauna am Beispiel von Gelsenkirchen (mittleres Ruhrgebiet). *Charadrius* 27: 49-62.
- Hasenclever, H. & V. Tiemeyer (1991): Brutvogelgemeinschaft des Turmfalken (*Falco tinnunculus*) und der Schleiereule (*Tyto alba*) in einem Brutkasten. *Charadrius* 27: 14-18.
- Hasenclever, H. (1992): Eine Brut des Turmfalken (*Falco tinnunculus*) und des Waldkauzes (*Strix aluco*) im selben Brutkasten. *Charadrius* 28: 164-166.
- Hasenclever, H., A. Kostrzewa & R. Kostrzewa (1989): Brutbiologie des Turmfalken (*Falco tinnunculus*): 16jährige Untersuchungen in Westfalen. *J. Ornithol.* 130: 229-237.
- Haupt, H. (2000): Welche Gründe gibt es für eine landesweite Jagd auf Rabenkrähe und Elster? *Charadrius* 36: 101-103.
- Haupt, H. (2009): Der Letzte macht das Licht an! – Zu den Auswirkungen leuchtender Hochhäuser auf den nächtlichen Vogelzug am Beispiel des „Post-Towers“ in Bonn. *Charadrius* 45: 1-19.
- Hauth, E. (1999): Erster Brutnachweis der Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*) in diesem Jahrhundert für NRW. *Charadrius* 35: 33-37.
- Hauth, E. & A. Skibbe (2010): Die Brutvögel der Wahner Heide. Erfassungszeitraum 1989-2008. Beitr. Avifauna NRW 38. NIBUK, Ruppichteroth.
- Hawke, C.J. & P.V. José (1996): Reedbed Management for Commercial and Wildlife Interests. RSPB, Sandy, UK.
- Hayo, L. & M. Buchheit (2005): Orpheusspötter *Hippolais polyglotta*. In: Bos, J., M. Buchheit, M. Austgen & O. Elle (Hrsg.): Atlas der Brutvögel des Saarlandes. Ornithologischer Beobachtungstering Saar, Medebachtal.
- Hayo, L. & H. Weyers (1986): Zum Brutvorkommen des Orpheusspötters (*Hippolais polyglotta*) im Saarland. *Lanius* 24: 15-43.
- Hayo, L. & G. Zannini (1986): Orpheusspötter *Hippolais polyglotta* im Saarland. *J. Ornithol.* 127: 244.
- Heckenroth, H. (1996): Weißstorch (*Ciconia ciconia*): Brutbestand 1971-1995 in Niedersachsen und Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, südlich Süderelbe. Informationsdienst Naturschutz Niedersachs. 16, Nr. 4.
- Heckenroth, H. & V. Laske (1997): Atlas der Brutvögel Niedersachsens 1981-1985 und des Landes Bremen. Naturschutz Landschaftspf. Niedersachs. 37: 1-329.
- Hegemann, A. (2004a): Illegale Greifvogelverfolgungen im Kreis Soest von 1992 bis 2003 – eine Auswertung mit Hinweisen zur Erkennung von Greifvogelverfolgungen. *Charadrius* 40: 13-27.
- Hegemann, A. (2004b): Der Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*) als aktueller Brutvogel NRW – Ansiedlung am Möhnesee in den Jahren 2000-2004. *Charadrius* 40: 161-170.
- Hegemann, A. & H. Knüwer (2004): Initiative zur Eindämmung illegaler Greifvogelverfolgung in NRW. *Charadrius* 40: 195-200.
- Hegemann, A. & H. Knüwer (2005): Illegale Greifvogelverfolgung – Ausmaße und Gegenmaßnahmen am Beispiel NRW. Ber. Vogelschutz 42: 87-95.
- Hegemann, A., P. Salm & B. Beckers (2008): Verbreitung und Brutbestand des Kiebitzes *Vanellus vanellus* von 1972 bis 2005 im Kreis Soest (Nordrhein-Westfalen). *Vogelwelt* 129: 1-13.
- Hegger, H.L. (1979): Zum Vorkommen der Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*) in Getreidefeldern. *Charadrius* 15: 131-133.
- Heilig, D. (2005): Erneute Zwergohreulenbrut in Rheinland-Pfalz. *Nat. schutz Rheinl.-Pfalz* 2/2005: 7.
- Hein, A. (1981): Erster Brutnachweis des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata*) im Wittgensteiner Land. *Charadrius* 17: 75.
- Heinen, W. (1985): Ungewöhnlicher Neststandort des Grauschnäppers (*Muscicapa striata*). *Charadrius* 21: 55.
- Heinen, W., P. Mäurer & H. Finken (1997): Erster Brutnachweis der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) im Niederrheinischen Tiefland bei Mönchengladbach-Wickrath. *Charadrius* 33: 62.
- Heinicke, T. & O. Geiter (2007): Kanadagans *Branta canadensis*. In: Heinicke, T. & U. Köppen (Hrsg.): Vogelzug in Ostdeutschland – Wasservögel, Teil 1. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 72-80.
- Helbig, A. & B. Fiala (1984): Erster Nestfund der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) in Westfalen. *Charadrius* 20: 44-48.
- Helbig, A., C. Stange & K. Conrads (1984): Brut eines Zwergschnäppers (*Ficedula parva*) im Grenzgebiet Westfalen – Niedersachsen bei Melle (Krs. Osnabrück): *Alcedo* 3: 14-21.
- Hentschel, E. & G.W. Wagner (1996): Zoologisches Wörterbuch. 6. Aufl., Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.
- Herhaus, F. (1998): Beobachtungshäufigkeit von Grauspecht (*Picus canus*) und Grünspecht (*Picus viridis*) im südlichen und östlichen Bergischen Land (Nordrhein-Westfalen) zwischen 1983 und 1997 – Hinweise zur Bestandsentwicklung. *Charadrius* 34: 139-143.
- Hering, J. (1994): Plastbindfaden erneut Todesursache bei nestjungen Baumfalken (*Falco subbuteo*). *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 7: 246.
- Herkenrath, H. (1984): Die bislang einzigen westfälischen Brutnachweise des Rothalstauchers (*Podiceps grisegena*). *Charadrius* 20: 104-105.
- Herkenrath, T. (1986): Zum ersten Brutnachweis des Gelbspötters (*Hippolais icterina*) im Oberbergischen Kreis. *Charadrius* 22: 120-121.
- Herkenrath, H. (1990): Stadtbruten der Hohltaube (*Columba oenas*) in Kleve. *Charadrius* 26: 57-58.
- Herkenrath, P. & H. Flosbach (2000): Zur Bestandsentwicklung ausgewählter häufiger Singvogelarten im Bergischen Land. *Charadrius* 36: 104-112.
- Herrlinger, E. (1973): Die Wiedereinbürgerung des Uhus *Bubo bubo* in der Bundesrepublik Deutschland. *Bonn. zool. Monographien* 4: 1-151.
- Herrmann, G. & M. Pratt (1998): Die Abhängigkeit der Abundanz von *Passer domesticus* und *Passer montanus* von Strukturparametern in agrarwirtschaftlich geprägten Lebensräumen. Diplomarbeit Universität Bielefeld.
- Hesse, M. & G. Knoblauch (1976): Zur Brutverbreitung der Grauammer (*Emberiza calandra*) in Westfalen. *Alcedo* 4/76: 75-86.
- HGON [Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz] (2010): Vögel in Hessen. Die Brutvögel Hessens in Raum und Zeit – Brutvogelatlas. Echzell.
- Hille, S. (1995): Nahrungswahl und Jagdstrategien des Rotmilans (*Milvus milvus*) im Biosphärenreservat Rhön/Hessen. *Vogel Umw.* 8: 99-126.
- Hille, B. (2009): Untersuchungen zur Luzerne-Präferenz der Grauammer (*Miliaria calandra*) im landwirtschaftlichen Rekultivierungsgebiet Garzweiler (Rheinisches Braunkohlenrevier) mit Hilfe künstlicher Singwarten. Diplomarbeit Universität Münster.
- Hingmann, W. & E. Lüttger (1965): Greifvogelbestandsaufnahme und Brutvorkommen des Habichts (*Accipiter gentilis*) am Niederrhein. *Charadrius* 1 (2): 36-39.
- Hingmann, W. & G. Wassink (2005): Der Uhu im Grenzgebiet Niederrhein/Niederlande. Bald (schon?) Brutvogel. *Naturspiegel* 3: 16-18.
- Hinterkeuser, M. (2006): Die Vogelwelt im östlichen Rhein-Sieg-Kreis. Eigenverlag, Neunkirchen-Seelscheid.
- Hinterkeuser, M. (2009): Turmfalken (*Falco tinnunculus*) brüten im östlichen Rhein-Sieg-Kreis bevorzugt in Fichten. *Berichtsh. Arbeitsgem. Bergisch. Ornithol.* 53: 13-15.
- Hirschfeld, A. (2010): Illegale Greifvogelverfolgung in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2005 bis 2009. *Charadrius* 46: 89-101.
- Hirschfeld, A. (2011): Illegale Greifvogelverfolgung in Nordrhein-Westfalen: Bericht für das Jahr 2010. *Charadrius* 47: 79-86.
- Hirschfeld, A. & A. Heyd (2005): Jagdbedingte Mortalität von Zugvögeln in Europa: Streckenzahlen und Forderungen aus Sicht des Vogel- und Tierschutzes. *Ber. Vogelschutz* 42: 47-74.
- Hoblyn, R. & T. Morris (1997): *Caprimulgus europaeus* – Nightjar. In: Hagemeyer, W.J.M. & M.J. Blair (Hrsg.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance, London: 422-423.
- Hölker, M. (1993): Untersuchungen zum Bruthabitat des Raubwürgers (*Lanius excubitor*) in Südwestfalen. *Ökol. Vögel* 15: 99-113.
- Hölker, M. (1996a): Rohrweihen im Kreis Soest. Ergebnisse aus den Jahren 1993 bis 1995. *ABU info* 20: 12-18.
- Hölker, M. (1996b): Die Grauammer – vom Charaktervogel zur Seltenheit: Ein Vergleich der Bestandsverhältnisse in der Hellwegbörde 1993 bis 1996 und 1972/73. *LÖBF-Mitteilungen* 4/1996: 51-54.
- Hölker, M. (2001/02): Erfolgreiche Brut der Kornweihe. *ABU info* 25/26: 88.
- Hölker, M. (2002): Bestandsentwicklung und Bruthabitat des Raubwürgers (*Lanius excubitor*) in der Medebacher Bucht 1990-2001. *Charadrius* 38: 169-179.
- Hölker, M. (2004): Die Vogelgemeinschaft der ackerbaulich geprägten Feldlandschaft der Hellwegbörde – Synökologische Studien an Brutvögeln in einer 6000 Jahre alten Kulturlandschaft. Dissertation Universität Münster.
- Hölker, M. (2005): Schutzprogramm für Wiesenweihen und Rohrweihen in Mittelwestfalen. Jahresberichte 2004. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest (Hrsg.), Bad Sassendorf.
- Hölker, M. (2006): Schutzprogramm für Wiesenweihen und Rohrweihen in Mittelwestfalen. Jahresberichte 2005. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest (Hrsg.), Bad Sassendorf.
- Hölker, M. & M. Jöbges (1995): Brutbestand und Verbreitung der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) in Nordrhein-Westfalen im Jahre 1993. *Charadrius* 31: 201-210.
- Hölker, M. & S. Klähr (2004): Bestandsentwicklung, Bruterfolg, Habitat und Nestlingsnahrung der Grauammer *Miliaria calandra* in der ackerbaulich intensiv genutzten Feldlandschaft der Hellwegbörde, Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 40: 133-151.

- Hölker, M. & T. Wagner (2006): Nahrungsökologie der Wiesenweihe *Circus pygargus* in der ackerbaulich intensiv genutzten Feldlandschaft der Hellwegbörde, Nordrhein-Westfalen. *Vogelwelt* 127: 37-50.
- Höller, T. & P. Wegner (2001): Der Wanderfalke ist in Gefahr! Die zweite Hybridfalken-Wildbrut in Deutschland zeigt die Brisanz der Hybridfalkenzucht. Greifvögel Falken. 2000: 64-66.
- Hölzinger, J. (1987): Die Vögel Baden-Württembergs, Bd. 1, Teil 2. Verlag Eugen Ulmer, Karlsruhe.
- Höntsch, K. (1996): Radiotelemetrische Untersuchungen zur Raum-Zeit-Nutzung des Kleinspechtes *Picoides minor*. Diplomarbeit, Universität Darmstadt.
- Hötker, H. (2004a): Vögel in der Agrarlandschaft – Bestand, Gefährdung, Schutz. NABU – Naturschutzbund Deutschland, Bergenhusen.
- Hötker, H. (2004b): Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*). In: Gedeon, K., A. Mitschke & C. Sudfeldt (Hrsg.): Brutvögel in Deutschland. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland, Hohenstein-Ernstthal: 20-21.
- Hötker, H. & J. van der Winden (2005): Bestand, Verbreitung und Schutz der Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger* in Deutschland 1990-2003 mit Vergleichen zu den Niederlanden. *Vogelwelt* 126: 179-186.
- Hötker, H., H. Jeromin & J. Melter (2007): Entwicklung der Brutbestände der Wiesen-Limikolen in Deutschland – Ergebnisse eines neuen Ansatzes im Monitoring mittelhäufiger Brutvogelarten. *Vogelwelt* 128: 49-65.
- Hoffmann, P. & G. McMullan (1991): Erste Brut des Austernfischers (*Haematopus ostralegus*) im Kreis Soest 1990. *Charadrius* 27: 98-100.
- Hofstetter, F.B. & E.R. Scherner (1980): *Streptopelia decaocto* – Türkentaube. In: Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer (Hrsg.) (1980): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 9: 98-141. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt/Main.
- Holland, M. & V. Wille (1991): Brutbestandserfassungen im RAMSAR-Gebiet „Untere Niederrhein“. *Charadrius* 27:161-181.
- Holling, M. & Rare Breeding Birds Panel (2011): Non-native breeding birds in the United Kingdom in 2006, 2007 and 2008. *British Birds* 104: 114-138.
- Hollunder, W., N. Jorek & M. Kipp (1977): Entwurf eines Schutzprogrammes für großflächige westfälische Feuchtgebiete. *Nat. Landsch.* 5: 231-235.
- Horstkotte, E. (1978): Vogelleben in und um Löhne. Verlag Hermann Brackmann. Löhne.
- Hubatsch, H. (1966): Die letzten Fischreiher (*Ardea cinerea*) am Niederrhein (Auszug aus dem Gelderner Heimatkalender 1965). *Charadrius* 2: 35.
- Hubatsch, H. (1968a): Die Ansiedlung von Tafel- und Reiherente (*Aythya ferina* und *Aythya fuligula*) an den Netteseen. *Charadrius* 4: 29-31.
- Hubatsch, H. (1968b): Die Bartmeise (*Panurus biarmicus*) als Brutvogel an den Netteseen. *Charadrius* 4: 233-236.
- Hubatsch, H. (1972): Der Fischreiherbestand im Rheinland von 1961-1971. *Charadrius* 8: 19-21.
- Hubatsch, H. (1975): Die Brutreviere der Rohrweihe am Niederrhein von 1950-1975. *Charadrius* 11: 92-100.
- Hubatsch, H. (1976a): Entwicklung und Schutz des Graureiherbestandes im Rheinland von 1971-1975. *Charadrius* 12: 9-14.
- Hubatsch, H. (1976b): Der Bestand des Ziegenmelkers im Grenzwald zwischen Kaldenkirchen und Bracht, Kreis Viersen. *Charadrius* 12: 36-37.
- Hubatsch, H. (1980): Der Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) am Niederrhein. *Charadrius* 16: 85-88.
- Hubatsch, H. (1981): Graureiherbestand hat sich erholt. *LÖLF-Mitt.* 4/1981: 133-138.
- Hubatsch, H. (1983): Das Blaukehlchen (*Luscinia svecica*) am Niederrhein. *Charadrius* 19: 23-26.
- Hubatsch, H. (1989): Kormorane (*Phalacrocorax carbo*) am Niederrhein. *Charadrius* 25: 13-16.
- Hubatsch, H. (1991): Reihercensus: Graureiher haben ihren Bestand von 1980 bis 1990 erweitert. *LÖLF-Mitt.* 4/1991: 20-23.
- Hubatsch, H. (1993): Die Graureiher des Rheinlandes von 1980-1990: *Charadrius* 29: 129-136.
- Hubatsch, K. (1996): Die Vögel des Kreises Viersen. *Beitr. Avifauna NRW* 34: 1-270. Bergheim.
- Hubatsch, H. & A. Meyer (1972): Artenliste der Vögel des Kreises Kempen-Krefeld und der Gemeinde Meerbusch (unpubl.). In: Mildenerger, H. (1984): Die Vögel des Rheinlandes 2. Papageien – Rabenvögel (Psittaculidae – Corvidae). *Beitr. Avifauna Rheinland* 19-21.
- Hübner, T. (1979): Haubentaucherverluste durch Angler. *Charadrius* 15: 88-89.
- Hübner, A. (2008): Habitatpräferenzen des Baumpiepers (*Anthus trivialis*) im Großraum Köln/Bonn. *Vogelwarte* 46: 364-365.
- Hübner, A. (2009a): Die Habitatwahl des Baumpiepers *Anthus trivialis* – eine Analyse mittels GIS. *Vogelwarte* 47: 165-170.
- Hübner, A. (2009b): Zur Bestandserfassung des Baumpiepers (*Anthus trivialis*) in der Wahner Heide. *Köln. ornithol. Ber.* 1: 4-16.
- Hüppeler, S. (2000): Nilgänse (*Alopochen aegyptiaca*) – Neubürger in der Avifauna Nordrhein-Westfalens. *Charadrius* 36: 8-24.
- Hüppeler, S., H. Köster & K.-H. Christmann (1998): Die Nonnengans (*Branta leucopsis*) – ein neuer Brutvogel am Unteren Niederrhein. *Charadrius* 34: 54-56.
- Hüppop, O. & K. Hüppop (2003): North Atlantic Oscillation and timing of Spring migration in birds. *Proc. R. Soc. London.* 270: 233-240.
- Hunke, W. (2011): Versuch eine Population des Raufußkauzes *Aegolius funereus* durch Anbringung von Nistkästen in den Jahren 1980 bis 2010 zu fördern. *Charadrius*: 93-101.
- Huntley, B., R.E. Green, Y.C. Collingham & S.G. Willis (2007): A climatic atlas of European breeding birds. Durham University, The RSPB and Lynx Editions, Barcelona.
- Hurtmann, H. (2005): Die Vögel der Stadt Mönchengladbach. NABU-Stadtverband (Hrsg.), Mönchengladbach.
- Husband, C. (1992): Eine erfolgreiche Brut des Schwarzmilans (*Milvus migrans*) im östlichen Münsterland. *Charadrius* 28: 192-193.
- Hustings, F. & J. Bekhuis (1993): Grauwe Klauwierien *Lanius collurio* in het Nederland van nu: restanten van een glorieuzer verleden? *Vogeljaar* 41: 2-17.
- Hustings, F., J. van der Coelen, B. van Noorden, R. Schols & P. Voskamp (2006): Avifauna van Limburg. Stichting Natuurpublicaties Limburg. Maastricht.
- Hyla, W. (1971): Bestandsabnahme des Wiesenpiepers (*Anthus pratensis*) durch Biotopveränderung in Oberhausen. *Charadrius* 7: 31.
- Hyla, W. (1972): Vordringen der Singdrossel (*Turdus philomelos*) ins Oberhausener Stadtgebiet. *Charadrius* 8: 59.
- Hyla, W. (1989): Beobachtungen zur Bestandsveränderung der Elsternpopulation in Oberhausen. *Charadrius* 25: 194-198.
- Hyla, W. (1991): Der Brutbestand der Elster (*Pica pica*) auf Probeflächen in Oberhausen. *Charadrius* 27: 27-30.
- IGS [Interessengemeinschaft Sperber] (2008): Der Sperber in Deutschland. Books on Demand, Norderstedt.
- Ikemeyer, D. (1996): Die Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*, Temminck 1820) als Brutvogel in NRW. *Charadrius* 32: 184-190.
- Ikemeyer, D. & B. von Bülow (1995): Zum Rückgang der Ortolan-Population am Rande der Hohen Mark bei Haltern/Westfalen. *Charadrius* 31: 137-146.
- Illner, H. (1988): Langfristiger Rückgang von Schleiereule (*Tyto alba*), Waldohreule (*Asio otus*), Steinkauz (*Athene noctua*) und Waldkauz (*Strix aluco*) in der Agrarlandschaft Mittelwestfalens 1984-1986. *Vogelwelt* 109: 145-151.
- Illner, H. (1992): Effects of roads with heavy traffic on Grey Partridge (*Perdix perdix*) density. *Gibier Faune Sauvage* 9: 467-480.
- Illner, H. (2007): Schutzprogramm für Wiesenweihen und Rohrweihen in Mittelwestfalen. Jahresberichte 2006. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest (Hrsg.), Bad Sassendorf.
- Illner, H. (2008): Schutzprogramm für Wiesenweihen und Rohrweihen in Mittelwestfalen. Jahresberichte 2007. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest (Hrsg.), Bad Sassendorf.
- Illner, H. (2008/09): Ökologischer Landbau: Eine Chance für gefährdete Feldvogelarten in der Hellwegbörde. *ABU-Info* 31/32: 30-37. (http://www.abu-naturschutz.de/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=55).
- Illner, H. (2009): Schutzprogramm für Wiesenweihen und Rohrweihen in Mittelwestfalen. Jahresberichte 2008. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest (Hrsg.), Bad Sassendorf.
- Illner, H. (2010): Schutzprogramm für Wiesenweihen und Rohrweihen in Mittelwestfalen. Jahresberichte 2009. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest (Hrsg.), Bad Sassendorf.
- Illner, H. (2010a): Erfolgreiche Brut einer Sumpfohreule *Asio flammeus* im EU-Vogelschutzgebiet Hellwegbörde (Mittelwestfalen) im Jahr 2007. *Charadrius* 46: 41-48.
- Illner, H. (2011): Schutzprogramm für Wiesenweihen und Rohrweihen in Mittelwestfalen. Jahresberichte 2010. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest (Hrsg.), Bad Sassendorf.
- Illner, H. (2012): Kritik an den EU-Leitlinien „Windenergie-Entwicklung und NATURA 2000“, Herleitung vogelartspezifischer Kollisionsrisiken an Windenergieanlagen und Besprechung neuer Forschungsarbeiten. *Eulen-Rd.blick* 62: 83-100.
- Illner, H., W. Lederer & K.-H. Loske (1989): Atlas der Brutvögel des Kreises Soest / Mittelwestfalen 1981-1986. ABU-Verlag, Löhne.
- Illner, H., P. Salm & D. Braband (2004): Modellvorhaben „Extensivierte Ackerstreifen im Kreis Soest“. *LÖBF-Mitt.* 2/2004: 33-38.
- Irsch, W. (1994): Zur Biologie des Orpheusspötters (*Hippolais polyglotta* Vieill., 1817) unter besonderer Berücksichtigung der Arealausweitung an der nordöstlichen Verbreitungsgrenze. *Abh. Delattinia* 21: 5-57.
- Isemann, P. (1987): Zur Ausbreitung der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) in Westeuropa: Die Lage an der südwestlichen Verbreitungsgrenze. *J. Ornithol.* 128: 110-111.

- Jachowski, J. (1979): Kanadagänse (*Branta canadensis*) am Rhein bei Duisburg. *Charadrius* 15: 86-87.
- Jacob, J.-P., C. Dehem, A. Burnel, J.-L. Dambiermont, M. Fasol, T. Kinet, D. van der Elst & J.-Y. Paquet (2010): Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007. Série „Faune – Flore – Habitats“ n°5. Aves et Région wallonne, Gembloux.
- Jacobs, R. (2002): Der Einfluss zunehmender Wasserpflanzenflur (Eutrophierung) auf die Ansiedlung von Reiherente (*Aythya fuligula*) und Blässhuhn (*Fulica atra*) am Beispiel der Wiehltalsperre. *Berichtsh. Arbeitsgem. Bergisch. Ornithol.* 41: 8-13.
- Janson, O. (1922): Natur- und heimatkundlicher Führer von Köln und Umgebung. Oskar Müller, Köln.
- Janssen, G., M. Hormann & C. Rohde (2004): Der Schwarzstorch *Ciconia nigra*. NBB 468. Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben.
- Jakober, H. & W. Stauber (1987): Zur Populationsdynamik des Neuntöters (*Lanius collurio*). *Beih. Veröff. Nat.schutz Landschaftspf. Bad.-Württ.* 48: 71-78.
- Janz, U. & C. Grüneberg (2010): Bestand und Verbreitung der Zaunammer in Rheinland-Pfalz. DDA-Monitoring-Rundbrief Herbst 2010: 8-11.
- Jaschke, K. (1970): Ein Beitrag zur Situation des Sperbers (*Accipiter nisus*) im Rheinland. *Charadrius* 6: 75-77.
- Jaschke, K. (1988): Die Ausbreitung des Birkenzeisigs (*Carduelis flammea*) in Bonn. *Charadrius* 24: 214-218.
- Jaschke, K. (1992): Verstärkung der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) in Bonn. *Charadrius* 28: 113-114.
- Jaschke, K. (1993): Binnenlandbrut der Silbermöwe (*Larus argentatus*) und Bruten der Reiherente (*Aythya fuligula*) in der Kölner Bucht. *Charadrius* 29: 35-36.
- Jaschke, K. (1998): Naturschutzaktion zur Erhaltung der Sturmmöwenkolonie (*Larus canus*) im NSG Stockemer See. *Charadrius* 34: 64-66.
- Jöbges, M. (2001): Wiederbesiedlung, Verbreitung und aktuelle Bestandsituation des Kolkraben *Corvus corax* in Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 37: 91-101.
- Jöbges, M. (2006): Die Rückkehr des Schwarzstorches *Ciconia nigra* nach NRW. *LÖBF-Mitt.* 2/2006: 14-16.
- Jöbges, M. (2011): Zur Verbreitung und Bestandsentwicklung des Weißstorches „*Ciconia ciconia*“ in Nordrhein-Westfalen. In: Bense, A.R. (2011): Storchenhauptstadt Petershagen. Die Rettung des Weißstorches in Nordrhein-Westfalen. Herausgegeben vom Aktionskomitee „Rettet die Weißstörche im Kreis Minden-Lübbecke“. Historisches Jahrbuch Petershagen. Bd. 8, Petershagen.
- Jöbges, M. & B. Conrad (1996): Monitoring ausgewählter Vogelarten. Zur aktuellen Bestandssituation, -entwicklung und Verbreitung von Rauhußkauz (*Aegolius funereus*), Kolkrabe (*Corvus corax*) und Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) in Nordrhein-Westfalen. *LÖBF-Mitt.* 4/1996: 46-50.
- Jöbges, M. & B. Conrad (1999): Verbreitung und Bestandssituation des Ziegenmelkers (*Caprimulgus europaeus*) und der Heidelerche (*Lullula arborea*) in NRW. *LÖBF-Mitt.* 2/1999: 33-40.
- Jöbges, M. & B. Conrad (2005): Auswirkungen von „fütterungsabhängigen“ Weißstörchen *Ciconia ciconia* aus Nordrhein-Westfalen auf die Wildpopulation. *Charadrius* 41: 22-29.
- Jöbges, M. & S. Franke (2006): Vom Totensymbol zum Sympathieträger: Situation des Steinkauzes *Athene noctua* in Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 42: 164-177.
- Jöbges, M. & H. König (2001): Urwaldspecht im Eichenwald. *LÖBF-Mitt.* 2/2001: 12-27.
- Jöbges, M., S. Pleines, W. Stichmann & H. Hubatsch (1998): Brutbestand und Verbreitung des Graureihers (*Ardea cinerea*) in NRW. *LÖBF-Mitt.* 3/1998: 68-74.
- Jöbges, M., J. Sartor, F. Schnurbus F. & M. Heeren (1997): Aktuelle Untersuchungen zur Verbreitung, Bestandssituation und Habitatpräferenz des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) in Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 33: 124-137.
- Jöbges, M., R. von Selle & J. Wegge (1998): Zum Vorkommen und Bestand des Wendehalses (*Jynx torquilla*) in NRW. *Charadrius* 34: 126-135.
- Jöbges, M., B. Beckers, M. Frede, D. Ikemeyer, F. Püchel-Wieling, S.R. Sudmann, R. Tüllinghoff, B. Walter & J. Weiss (2012): Brutbestände von Bekassine *Gallinago gallinago*, Uferschnepfe *Limosa limosa*, Großem Brachvogel *Numenius arquata* und Rotschenkel *Tringa totanus* 2004-2009 in Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 48: 1-11.
- Joest, R. (2008/09): Hilfe für Wiesenweihe, Feldlerche und Co. Zur Wirksamkeit des Vertragsnaturschutzes für die Brutvögel der Hellwegbörde. *ABU-Info* 31/32: 20-29. (http://www.abu-naturschutz.de/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=55).
- Joest, R. (2009a): Vertragsnaturschutz für Feldvögel in der Hellwegbörde. *Nat. NRW* 3/2009: 22-25.
- Joest, R. (2009b): Bestand, Habitatwahl und Schutz des Wachtelkönigs im Europäischen Vogelschutzgebiet Hellwegbörde in den Jahren 2007 und 2008. *Jahresber. 2008, ABU, Soest, Bad Sassendorf Lohne.*
- Joest, R. (2011): Jahresbericht über die Umsetzung der Hellwegbördevereinbarung 2010. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest (Hrsg.), Bad Sassendorf.
- Joest, R. (2012): Kartierung und Schutz des Wachtelkönigs im Europäischen Vogelschutzgebiet Hellwegbörde in den Jahren 2007 bis 2011. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz, Bad Sassendorf-Lohne.
- Joest, R. & H. Illner (2011): Nutzungswandel und Vogelschutz in der Agrarlandschaft – Aktuelle Entwicklungen im Vogelschutzgebiet Hellwegbörde (NRW). *Vogelwarte* 49: 259-260.
- Joest, R., C. Oberwelling, B. Walter & K. Nottmeyer (2010): Bericht und Auswertung zum Monitoring für das NRW-Programm „1000 Fenster für die Lerche“. Dachverband Biologischer Stationen im Auftrag des LANUV.
- Joest, R., L. Dahlbeck, M. Olthoff & B. Walter (2011): Monitoring für das NRW-Programm „1000 Fenster für die Lerche“, Bericht und Auswertung für die Jahre 2010 und 2011. Biologische Station Gütersloh/Bielefeld e.V. im Auftrag des LANUV - Vogelschutzwarte.
- Jost, O. (1970): Erfolgreiche Schutzmaßnahmen in den Brutrevieren der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*). *Angewandte Ornithologie* 3: 101-108.
- Kaatz, C. & M. Kaatz (2001): 2. Jubiläumsband Weißstorch – 2. Jubilee Edition White Stork, 8 u. 9. Storchentag 1999/2000. Tagungsbandreihe des Storchenhofes Lohburg.
- Kämpfer, A. & W. Lederer (1990): Nachweis von Bigynie beim Grauschnäpper *Muscicapa striata*: *Vogelwelt* 111: 189-196.
- Kämpfer-Lauenstein, A. & W. Lederer (1992): Bemerkenswerte Umsiedlungen von Rauhußkauz-Weibchen (*Aegolius funereus*). *Vogelwarte* 36: 236-237.
- Kämpfer-Lauenstein, A. & W. Lederer (2006): Naturhöhlen in Bäumen als Brutplatz und Tageseinstand für den Steinkauz. *Charadrius* 42: 201-207.
- Kämpfer-Lauenstein, A. & W. Lederer (2010): Populationsdynamik des Rauhußkauzes *Aegolius funereus* im Arnberger Wald. *Charadrius* 46: 69-78.
- Kahl-Dunkel, A. (1994): Siedlungsdichteuntersuchung bei Stadt- und Parkvögeln im Kölner Süden. *Charadrius* 30: 119-131.
- Kahl-Dunkel, A. (2002): Warum konnte Köln zur Hochburg der Halsbandsittiche (*Psittacula krameri*) in Deutschland werden? *Charadrius* 38: 162-168.
- Kahl-Dunkel, A. & R. Werner (2002): Winterverbreitung des Halsbandsittichs *Psittacula krameri* in Köln. *Vogelwelt* 123: 17-20.
- Kaiser, E. (2010): Mauersegler gezielt ansiedeln. Audio CD. Edition Ample (Bogner Records).
- Kannhäuser, H., J. Giese & R. Mönig (2003): Ergebnisse einer Langzeitstudie zur Population der Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*) an einem Niederrheinischen Bach – der Itter. *Charadrius* 39: 71-74.
- Kartiergemeinschaft Wahner Heide (2010): Neuntöter. In: Schmiegel, R., J. Heimann & D. Buschmann (Hrsg.): Ornithologischer Sammelbericht für das südliche Bergische Land. *Berichtsh. Arbeitsgem. Bergisch. Ornithol.* 55: 54.
- Kehren, S. & J. Elsner (2004): Zur Brutbiologie des Haussperlings *Passer domesticus*: fünfjährige Beobachtungen in einem Hofareal. *Charadrius* 40: 68-77.
- Kenward, R. (2006): *The Goshawk*. T & A D POYSER, London.
- Kersten, H.-G., B.C. Meyer & V. Wille (1997): Erfolgreiche Brut des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) im Kreis Kleve. *Charadrius* 33: 117-123.
- Kestenholz, M., L. Heer & V. Keller (2005): Etablierte Neozoen in der europäischen Vogelwelt – eine Übersicht. *Ornithol. Beob.* 102: 153-180.
- Kieckbusch, J. & W. Knief (2007): Brutbestandssituation des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Deutschland und Europa. Fachtagung Kormoran 2006. Tagungsband mit den Beiträgen der Fachtagung vom 26.-27. September 2006 in Stralsund. *BfN-Skripten* 204, Bonn.
- Kieckbusch, J., W. Knief & C. Herrmann (2010): Bestandsanstieg und seine Grenzen: Brutbestandssituation des Kormorans in Deutschland. *Falke* 57, Sonderheft: 4-9.
- Kiel, F. (2007): Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen. *MUNLV NRW* (Hrsg.), Düsseldorf.
- Kilimann, N., F. Rynkowski & M. Gottschling (1999): *Die Vögel von Herne*. Eigenverlag, Herne.
- Kimmel, O. & H. Michaelis (2004): Mandarinente *Aix galericulata* brütete in Schleiereulenkästen. *Charadrius* 39: 89-90.
- Kinzelbach, R. (2002): Areal und Ausbreitung der Beutelmeise *Remiz pendulinus* (L., 1758) vor dem 19. Jahrhundert. *Ökol. Vögel* 24: 65-95.
- Kinzelbach, R. (2007): Klimawandel – ein Feigenblatt? Der Treibhauseffekt und die Folgen für die Tierwelt. *BIUZ* 37: 250-259.
- Kipp, M. (1982): Ergebnisse individueller Farbberingung beim Großen Brachvogel und ihre Bedeutung für den Biotopschutz. *Beih. Veröff. Nat.schutz Landschaftspf. Bad.-Württ.* 25: 87-96.
- Kipp, M. (1999): Zum Bruterfolg beim Großen Brachvogel (*Numenius arquata*). *LÖBF-Mitt.* 3/1999: 47-49.
- Kipp, M. (2003): Zur Brutbestandssituation des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) im Kreis Minden-Lübbecke. *Charadrius* 39: 182-186.

- Kipp, M. (2011): Zur Effizienz des künstlichen Ausbrütens von Brachvogelküken *Numenius arquata* als Maßnahme des Artenschutzes. *Charadrius* 47: 29-34.
- Kipp, C. & M. Kipp (2003): Auswirkungen von Gelegeschutz und Jungvogelsicherung auf den Reproduktionserfolg des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*). *Charadrius* 39: 175-181.
- Kipp, C. & M. Kipp (2009): Zur Bestandentwicklung des Großen Brachvogels *Numenius arquata* in der „Wüste“, bei Schwege. *Charadrius* 45: 27-32.
- Kirby, W., K. Black, S. Pratt & R. Bradbury (2005): Territory and nest-site habitat associations of Spotted Flycatchers *Muscicapa striata* breeding in central England. *Ibis* 147: 420-424.
- Kivelitz, H., H. Laser & N. Lütke-Entrup (2011): Entwicklung des Grünlandanteils in Nordrhein-Westfalen. *Nat. NRW* 4/2011: 33-38.
- Kladny, M. (2010): Die Münsteranerin. AGW-NRW, Jahresbericht 2010: 4-5, 21-23.
- Klaus, S. & H.-H. Bergmann (2004): Situation der waldbewohnenden Raufußhuhnarten Haselhuhn *Bonasa bonasia* und Auerhuhn *Tetrao urogalus* in Deutschland – Ökologie, Verbreitung, Gefährdung und Schutz. *Vogelwelt* 125: 283-295.
- Klausnitzer, B. (1993): Ökologie der Großstadtfauna. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
- Klein, A. (2005): Die Kanadagans (*Branta canadensis*) in den Rieselfeldern Münster. Jahresber. Biol. Stat. „Rieselfelder Münster“ 7: 46-53.
- Klein, H.P. (1980): Erster gesicherter Brutnachweis der Schnatterente (*Anas strepera*) in Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 16: 88-90.
- Klein, H.P. (1981a): 28. Ornithologischer Sammelbericht für das Rheinland vom 16.3.1980 bis 15.9.1980. *Charadrius* 17: 52-64.
- Klein, H.P. (1981b): Brutbestandsaufnahmen von Ziegenmelker (*Caprimulgus euroaeus*) und Brachpieper (*Anthus camprestis*) im Westteil des Kreises Viersen. *Charadrius* 17: 73-74.
- Klein, B. (1990): Brutnachweis des Birkenzeisigs (*Carduelis flammea*) in Kleinenbroich, Kr. Neuss. *Charadrius* 26: 124.
- Klein, R. & A. Buchheim (1997): Die westliche Schwarzmeerküste als Kontaktgebiet zweier Großmöwenformen der *Larus cachinnans*-Gruppe. *Vogelwelt* 118: 61-79.
- Kneitz, H. & D. Uhrich (1997): Eiderente (*Somateria mollissima*) brütet in Würzburg. *Avifaun. Inf.dienst Bayern* 4: 138-139.
- Knief, W., R.K. Berndt, B. Hälterlein, K. Jeromin, J. Kieckbusch & B. Koop 2010: Brutvögel Schleswig-Holsteins – Rote Liste. 5. Fassung. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MLUR) des Landes Schleswig-Holstein. Kiel.
- Kniprath, E. (1965): Eisvogelverluste in strengen Wintern. *J. Ornithol.* 106: 340-346.
- Kniprath, E. (2004): Nistplatzkonkurrenz zwischen Schleiereule (*Tyto alba*) und Turmfalke (*Falco tinnunculus*) – Ein Produkt des Vogelschutzes? *Eulen-Rd.blick* 51/52: 15-17.
- Knorr, E. (1967): Die Vögel des Kreises Erkelenz. Schriftenreihe des Landkreises Erkelenz 2. Neuss.
- Knüwer, H. (1996): Zur Situation des Graureihers im Kreis Warendorf; speziell im Gebiet der Gemeinde Wadersloh. *Flora Fauna Kreis Warendorf – Beitr. Naturkde.* 8: 25-30.
- Knüwer, H., G. Bülter, F. Cösters & B. Och (1999): Die Rohrweihe im Kreis Warendorf. *Flora Fauna Kreis Warendorf - Beitr. Naturkde.* 9: 6-15.
- Koch, R. (1878/79): Die Brutvögel des Münsterlandes. Jahres-(Sitzungs-) Berichte der Zoologischen Sektion des Westf. Provinzial-Vereins für Wissenschaft u. Kunst, Münster (S.Z.S.) 6: 58-73.
- Koch, R. (1921/1923): Veränderungen in der Ornis des Münsterlandes innerhalb der letzten 60 Jahre. Sitzungsber. Zoolog. Sektion d. Westfäl. Provinzialvereins f. Wissensch. u. Kunst 50-52: 77-87.
- Koch, H. (2000): Geschichte der Jagd ab 1848 im Hochsauerland. In: Kreisjägerschaft Hochsauerland e.V. (Hrsg.): *Sauerländer Jäger, der Natur verbunden*. Arnsberg.
- König, H. (1991): Arbeitsatlas der Brut- und Sommervögel des Hochsauerlandkreises. Unveröff. Manuskript.
- König, H. (1998): Verbreitung und Habitatwahl des Mittelspechtes im nördlichen Sauerland. *Charadrius* 34: 179-193.
- König, H. (2008): Biodiversität in nordrhein-westfälischen Siedlungen. *Nat. NRW* 2/2008: 44-46.
- König, H. (2010): Die Ökologische Flächenstichprobe (ÖFS) in Nordrhein-Westfalen. In: *Naturschutz-Monitoring in Deutschland: Stand und Perspektiven; Tagungsband zum Statusseminar an der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm vom 14. bis 18. April 2008: 19-28*. Landwirtschaftsverlag, Münster.
- König, H. & G. Santora (2007): Landesweites Brutvogelmonitoring. *Nat. NRW* 3/2007: 21-26.
- König, H. & G. Santora (2011): Die Feldlerche – Ein Allerweltsvogel auf dem Rückzug. *Nat. NRW* 1/2011: 24-28.
- Köpke, G. (1984): Erfolgreiche Drittbrut des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) auf der Lippe in Hamm. *Charadrius* 20: 195-197.
- Köpke, G. (1986): Bruten der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) in Hamm (Westfalen). *Charadrius* 22: 157-161.
- Köpke, G. (1987): Halsbandsittich (*Psittacula krameri*) Brutvogel in Hamm (Westf.). *Charadrius* 23: 258-259.
- Köpke, G., A. Nagel & W. Pott (2000): Über die Vogelwelt der Stadt Hamm (Westf.) 1959-1999. Eine kommentierte Artenliste mit Hinweisen für den Artenschutz. Hamm.
- Köster, H., G. Nehls & K.-M. Thomsen (2001): Hat der Kiebitz noch eine Chance? Untersuchungen zu den Rückgangsursachen des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*) in Schleswig-Holstein. *Corax* 18, Sonderheft 2: 121-132.
- Kötter, F. (1974): Zur Brutbiologie der Weidenmeise (*Parus montanus*). *Charadrius* 10: 55-58.
- Koffijberg, K. (2006): Kwartelkoningen in akkergebieden: tweederangs habitat of vorwaardig alternatief voor hooiland. *Limosa* 79: 73-74.
- Koffijberg, K. & J. Nienhuis (2003): Kwartelkoningen in het Oldambt een onderzoek naar de populatiedynamiek, habitatkeuze en mogelijkheden tot beschermingsmaatregelen in akkers. SOVON-onderzoeksrapport 2003/04. SOVON Vogelonderzoek Nederland/Provincie Groningen, Groningen.
- Koffijberg, K. & N. Schäffer (Hrsg.) (2006): International single species action plan for the conservation of the Corncrake *Crex crex*. CMS Technical Series No. 14 & AEW Technical Series No. 9. Bonn, Germany.
- Koffijberg, K., L. Dijkse, B. Hälterlein, K. Laursen, P. Potel & P. Südbeck (2006): Breeding Birds in the Wadden Sea in 2001. Results of the total survey in 2001 and trends in numbers between 1991-2001. Wadden Sea Ecosystem No. 22.
- Kolbe, H. (1999): Die Entenvögel der Welt. 5. überarbeitete Aufl., Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- Kolshorn, P. & H. Klein (1999): Die Brutvögel des ehemaligen Munitionsdepots Brüggem-Bracht, Kreis Viersen, mit einer landesweit bedeutsamen Kernpopulation von Heidelerche (*Lullula arborea*) und Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*). *Charadrius* 35: 81-87.
- Kooiker, G. (2005): Brutvogelatlas Stadt Osnabrück. Eigenverlag, Osnabrück.
- Kooiker, G. (2006): Brutbestandsentwicklung der Elster (*Pica pica*) in Osnabrück von 1984 bis 2005. *Vogelkdl. Ber. Niedersachs.* 38: 91-99.
- Kooiker, G. (2008): Neue und ergänzende Ergebnisse zum Bruterfolg einer auf Ackerland brütenden Kiebitzpopulation *Vanellus vanellus* bei Osnabrück. *Vogelkdl. Ber. Niedersachs.* 40: 321-331.
- Kooiker, G. & C.V. Buckow (1997): Der Kiebitz. Flugkünstler im offenen Land. Sammlung Vogelkunde im Aula-Verlag. Aula-Verlag, Wiesbaden.
- Koop, B. (1998): Ist der Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*) ein r-Strategie? Populationsdynamik und Habitatwahl unter dem Einfluß interspezifischer Konkurrenz. *Corax* 17: 199-214.
- Kostrzewa, A. (2008): Nahrungswahl von Mäusebussard *Buteo buteo* und Habicht *Accipiter gentilis* – eine Metaanalyse rheinischer und europäischer Daten der letzten hundert Jahre. *Charadrius* 44: 1-18.
- Kostrzewa, A. & R. Kostrzewa (1988): Langfristige Untersuchungen über Bestandstrends und Populationsdynamik der Greifvögel in der Niederrheinischen Bucht. *Charadrius* 24: 148-157.
- Kostrzewa, A., G. Speer, W. von Dewitz & H. Weiser (2000): Zur Populationsökologie des Habichts (*Accipiter gentilis*) in der Niederrheinischen Bucht (1981-1998). *Charadrius* 36: 80-93.
- Kostrzewa, A., W. von Dewitz, R. Kostrzewa, G. Speer & H. Weiser (2001): Zur Populationsökologie des Mäusebussards (*Buteo buteo*) in der Niederrheinischen Bucht (1980-1999).
- Kottolinsky, E., N. Maak & R. Steinbrink (2010): Erster Zaunammer-Brutnachweis in Nordrhein-Westfalen seit über 50 Jahren. *Charadrius* 46: 224-226.
- Kowalski, H. (1982a): Die Vogelwelt des Oberbergischen Kreises. Oberbergische Reihe, Bd. 3, Gronenberg Verlag, Gummersbach.
- Kowalski, H. (1982b): Artenhilfsprogramm Raubwürger – *Lanius excubitor*. Naturschutz praktisch, Merkblatt Nr. 20 zum Biotop- und Artenschutz. LÖLF, Recklinghausen (Hrsg.).
- Kowalski, H. (1982c): Reiherente (*Aythya fuligula*) 1981 auch Brutvogel im Oberbergischen Kreis. *Charadrius* 18: 133-134.
- Kowalski, H. (1983): Landschaftsveränderungen durch Talsperrenbau und ihre Auswirkungen auf die Vogelwelt am Beispiel von Raubwürger (*Lanius excubitor*) und Rotrückwürger (*Lanius collurio*). *Charadrius* 19: 26-32.
- Kowalski, H. (1984a): Artenhilfsprogramm Rotrückwürger – *Lanius collurio*. Naturschutz praktisch, Merkblatt Nr. 55 zum Biotop- und Artenschutz. LÖLF, Recklinghausen (Hrsg.).
- Kowalski, H. (1984b): Bestandserhebung des Raubwürgers (*Lanius excubitor*) in NRW mit überregionalen Daten zur Bestandentwicklung. *Charadrius* 20: 158-167.

- Kowalski, H. (1985): Zur Bestandssituation des Raubwürgers. Ber. dtsh. Sekt. int. Rat Vogelschutz 25: 137-149.
- Kowalski, H. (1987): Die Verbreitung des Neuntötters (*Lanius collurio*) in Nordrhein-Westfalen. Charadrius 23: 12-27.
- Kowalski, H. (1995): Wahl der Niststandorte in einer traditionellen Bruthecke des Neuntötters (*Lanius collurio*). Charadrius 31: 39-41.
- Krause, T. (2001): Zur Verbreitung des Halsbandsittichs (*Psittacula krameri*) im Rheinland im Kontext der gesamten westeuropäischen Verbreitung. Diplomarbeit Universität Düsseldorf.
- Krause, T. (2004): F1- und F2-Hybriden zwischen Alexandersittich *Psittacula eupatria* und Halsbandsittich *P. krameri* im Volksgarten in Düsseldorf. Charadrius 40: 7-12.
- Kretzschmar, E. (1995): 31. Ornithologischer Sammelbericht für Westfalen. Charadrius 31: 147-148.
- Kretzschmar, E. (1996): 33. Ornithologischer Sammelbericht für Westfalen. Charadrius 32: 73-78.
- Kretzschmar, E. (1999): „Exoten“ in der Avifauna Nordrhein-Westfalens. Charadrius 35: 1-15.
- Kretzschmar, E. & R. Kretzschmar (2009): Ornithologischer Jahresbericht für Dortmund 2008. Dortmund.
- Kretzschmar, E. & R. Kretzschmar (2010): Ornithologischer Jahresbericht für Dortmund 2009. Dortmund.
- Kretzschmar, E. & R. Neugebauer (1980): Beiträge zur Avifauna Dortmunds – Sturmvögel – Entenvögel. Dortmunder Beitr. Landeskd. 13: 69 – 87.
- Kretzschmar, E. & R. Neugebauer (1985): Ein weiterer Nestfund der Beutelmehse (*Remiz pendulinus*). Charadrius 21: 53.
- Kretzschmar, E. & R. Neugebauer (2003): Dortmunder Brutvogelatlas. Kartierung 1997-2002. Naturschutzbund Deutschland (NABU) - Stadtverband Dortmund.
- Kretzschmar, E. & F. Ostermann (1999): Erster Brutnachweis der Rotschulterente (*Callonetta leucophrys*) in Dortmund. Charadrius 35: 16-19.
- Kretzschmar, E., S. Glinka & A. Müller (1999): 4. Ornithologischer Sammelbericht für Nordrhein-Westfalen. Charadrius 35: 125-134.
- Kreuziger J. & S. Stübing (2005): Die aktuelle Bestandssituation des Blaukehlchens (*Luscinia svecica cyaneula*) in Hessen. Vogel Umw. 16: 31-42.
- Kreuziger, J. & S.R. Sudmann (2007): Die aktuelle Situation im EU-Vogelschutzgebiet „Rheinauen bei Biblis und Groß-Rohrheim“. Collurio 25: 83-93.
- Krüger, S. (1979): Der Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*. NBB 525. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt.
- Krüger, H. (1989): Zur Dismigration des Baumfalke, *Falco subbuteo*. Charadrius 25: 145.
- Krüger, T. (2002): Verbreitung, Bestand und Habitatwahl des Blaukehlchens (*Luscinia svecica cyaneula*) in Niedersachsen 2001: Ergebnisse einer landesweiten Erfassung. Vogelkd. Ber. Niedersachs. 34: 1-21.
- Krüger, O. (2009): Common Buzzard, Goshawk, Eagle Owl: a natural experiment in Eastern Westphalia – Mäusebussard, Habicht, Uhu: ein natürliches Experiment in Ostwestfalen. In: Stubbe M. & A. Stubbe (Hrsg.): Populationsökologie Greifvögel und Eulenarten 6: 303-312.
- Krüss, A. (2010): Der Kormoran aus Naturschutzsicht. In: LNU (Hrsg.): Berichte der Arnberger Umweltgespräche „Tiere erobern neue Lebensräume – Schutz oder Regulierung sich ausbreitender Arten?“. 63-73.
- Kubetzki, U. & S. Garthe (2010): Über den Dächern von Kiel und Westerland: Möwen als Dachbrüter in Schleswig-Holstein. Corax 21: 301-309.
- Kühnapfel, K.-H. (2006): Zur Vogelwelt der Kläranlage Kamen. Charadrius 42: 120-155.
- Kühnapfel, K.-H. & E. Kretzschmar (1986): Erster Brutnachweis des Säbelschnäblers (*Recurvirostra avosetta*) in Westfalen. Charadrius 22: 192-198.
- Kuhn, M. & H. Weiser (1995): Baumfalke (*Falco subbuteo*) in Nestmaterial gefangen. Charadrius 31: 188-189.
- Kuhnen, K. (1970): Zum Brutvorkommen des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) am Niederrhein. Charadrius 6: 92-95.
- Kuhnen, K. (1975): Bestandsentwicklung, Verbreitung, Biotop und Siedlungsdichte der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) 1966-1973 am Niederrhein. Charadrius 11: 1-24.
- Kunz, A. & L. Simon (1987): Die Vögel in Rheinland-Pfalz. Nat.schutz Ornithol. Rheinl.-Pfalz 4: 353-648.
- Laakmann, P. (1987): Neue Heimstatt Niederrhein? Erster erfolgreicher Brutnachweis der Schwarzkopfmöwe. Buntspecht 10: 50-51.
- Laakmann, P. & M. Böing (1993): Beobachtungen zum Brutverhalten eines erstmals in Deutschland im Binnenland brütenden Heringsmöwenpaares (*Larus fuscus*). Charadrius 29: 78-81.
- LAG VSW [Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten] (2007): Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogel-Lebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten. Ber. Vogelschutz 44: 151-153.
- Landenberg, D. & F. Turrian (1982): La progression de L'Hypolaïs polyglotte dans le Pays de Genève. Nos Oiseaux 36: 309-324.
- Lang, M. (2007): Niedergang der süddeutschen Ortolan-Population *Emberiza hortulana* – liegen die Ursachen außerhalb des Brutgebiets? Vogelwelt 128: 179-196.
- Langgemach, T. & J. Bellebaum (2005): Prädation und der Schutz bodenbrütender Vogelarten in Deutschland. Vogelwelt 126: 259-298.
- Langmann, J. & L. Meckling (2005): Das Weißstorchprogramm Minden-Lübbecke. Charadrius 41: 38-43.
- LANUV [Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz] NRW (2011): Maßnahmenkonzept für das EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“, DE-4203-401. Recklinghausen. <http://www.lanuv.nrw.de/natur/schutzgeb/vogelschutzgebiete/mako.htm>
- Laske, V. & A. Helbig (1986): The winter resistance of a population of the European Kingfisher (*Alcedo atthis ispida*). Ric. Biol. Selvaggina 10, Suppl.: 215-227.
- Laske, V., K. Nottmeyer-Linden & K. Conrads (Hrsg.) (1991): Die Vögel Bielefelds. Ilex-Bücher Natur 2. Bielefeld.
- Lauruschkus, H. (2011): Die erste Zwergdommelbrut in den Rieselfeldern Münster. Charadrius 47: 203-206.
- Lawton, J.H. (1993): Range, population abundance and conservation. Trends in Ecology and Evolution 8: 409-413.
- Le Roi, O. (1906): Die Vogelfauna der Rheinprovinz. Verh. Naturhist. Ver. Rheinl. 63: 1-325.
- Le Roi, O. & H. Geyr von Schweppenburg (1912): Beiträge zur Ornithologie der Rheinprovinz. Erster Nachtrag zur „Vogelfauna der Rheinprovinz“. Verhandl. Naturhist. Verein Rheinl. 69: 1-150.
- Leder, B., A. Lehmann & A. Leonhardt (2005): Vegetationsentwicklung und Avifauna auf Windwurfflächen. LÖBF-Mitt. 3/2005: 39-42.
- Legge, H. (2007): Bericht der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft im VNV (OAG) für die Jahre 2005 und 2006. Irrgeister 24: 53-73.
- Legge, H. (2009a): Zur Brutverbreitung der Heidelerche *Lullula arborea* im Hochsauerlandkreis. Charadrius 45: 213-218.
- Legge, H. (2009b): Brutbestandserfassung von Baum- *Anthus trivialis* und Wiesenpieper *A. pratensis* im NSG „Neuer Hagen“ im Jahr 2007. Charadrius 45: 219-224.
- Legge, H. & R. Götte (2009): Bericht der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft im VNV (OAG) für die Jahre 2007 und 2008. Irrgeister: 8-29.
- Lehmann, H. & R. Mertens (1965): Die Vogelfauna des Niederbergischen. Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 20: 11-164.
- Lehn, K. (2008): Entwicklung der Brutvogelbestände (Rote-Liste-Arten NRW) im Großen Torfmoor 2004-2006. NUA-Heft Nr. 23: 112-119.
- Leisler, B. (1981): Die ökologische Einnischung der mitteleuropäischen Rohrsänger (*Acrocephalus*, *Sylvia*ae). I. Habitattrennung. Vogelwarte 31: 45-74.
- Leisler, B. (1985): Lebensraumsprüche und mögliche Gefährdungsfaktoren des Drosselrohrsängers (*Acrocephalus arundinaceus*). Ber. dtsh. Sekt. int. Rat Vogelschutz 25: 127-136.
- Leisler, B. & K. Schulze-Hagen (2011): The Reed Warblers. KNNV Publishing, Zeist, NL.
- Leisten, A. (2002): Die Vogelwelt der Stadt Düsseldorf. Biol. Stat. Urdenbacher Kämpfe (Hrsg.), Monheim am Rhein.
- Liesen, J. (2012): Der Grauspecht *Picus canus* im Kottenforst bei Bonn – historische und aktuelle Verbreitung sowie Diskussion möglicher Rückgangursachen. Charadrius 48: 12-22.
- Lindner, M. (2003/04): Ein wechselvolles Schicksal des Königs der Nacht – Biologie und Bestandsveränderungen des Uhus (*Bubo bubo*) unter besonderer Berücksichtigung des Hochsauerlandkreises. Irrgeister 20/21: 50-73.
- Lippeck, W. (2009): Zur Brutbiologie und Ortstreue des Waldlaubsängers *Phylloscopus sibilatrix* in Westfalen-Lippe. Vogelwelt 130: 165-174.
- Lloyd, T. & P. Stertkamp (1996): Der Eisvogel (*Alcedo atthis*) in Ostwestfalen-Lippe – Ergebnisse 20jähriger Beobachtungen. Charadrius 32: 56-61.
- LÖBF [Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten NRW] (2005): Natur und Landschaft in Nordrhein-Westfalen 2005. Grundlagen – Zustand – Entwicklung. LÖBF-Mitt. 4/2005: 1-283.
- Lorgè, P. (2007): Die Bestände von Rotmilan *Milvus milvus* und Schwarzmilan *Milvus migrans* in Luxemburg zwischen 1997 und 2003. Regulus Wissenschaftl. Ber., LNVL.
- Loske, K.-H. (1980): Störungen des Brutablaufs bei der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) durch Badende und Angler. Charadrius 16: 90-93.
- Loske, K.-H. (1983): Zur Verbreitung der Uferschwalbe in Westfalen im Jahr 1981 – ein Vorläufiger Überblick. Beih. Veröff. Natursch. Landschaftspf. Bad.-Württ. 37: 43-52.
- Loske, K.-H. (1985): Notizen zur Biometrie, Brutbiologie und Ökologie des Waldlaubsängers (*Phylloscopus sibilatrix*) in Mittelwestfalen. Charadrius 21: 116-123.
- Loske, K.-H. (1986): Zum Vorkommen der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) in Westfalen im Jahr 1983. Charadrius 22: 82-90.
- Loske, K.-H. (1987): Brutnachweis der Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*) in Westfalen. Charadrius 23: 209-210.

- Loske, K.-H. (1988): Untersuchungen zum Brutvogelbestand von Fichtenalthölzern in Südostwestfalen. *Charadrius* 24: 44-60.
- Loske, K.-H. (2008): Der Niedergang der Rauchschnäbel *Hirundo rustica* in den westfälischen Hellwegbörden 1977-2007. *Vogelwelt* 129: 57-71.
- Loske, K.-H. (2009): Ausgleichsflächen für den Rotmilan (*Milvus milvus*). *Nat. NRW* 34,4: 33-36.
- Loske, K.-H. & W. Lederer (1987): Bestandsentwicklung und Fluktuationsrate von Weistreckenziehern in Westfalen: Uferschnäbel (*Riparia riparia*), Rauchschnäbel (*Hirundo rustica*), Baumpieper (*Anthus trivialis*) und Grauschnäpper (*Muscicapa striata*). *Charadrius* 23: 101-127.
- Loske, K.-H., S. Glinka & M. Jöbges (1999): Bestandserfassung und Verbreitung der Uferschnäbel (*Riparia riparia*) 1998 in NRW. *LÖBF-Mitt.* 2/1999: 51-59.
- Loske, K.-H., W. Eickhoff & H. Ulitzka (2001): Bestandsentwicklung des Mauerseglers *Apus apus* in Anröchte/Mittelwestfalen von 1989 bis 2000. *Vogelwelt* 122: 351-355.
- Lübcke, W. (1989): Brutete die Zippammer (*Emberiza cia*) am Edersee? *Vogelkundliche Hefte Edertal* 15: 92-93.
- Lugrin, B., A. Barbalat & P. Albrecht (2003): Atlas des oiseaux nicheurs du Canton de Genève. Editions Nicolas Junod, Genève.
- Lutz, M. & F.P. Jensen (2007): Management Plan for Turtle Dove (*Streptopelia turtur*) 2007-2009. European Communities, Technical Report 007-2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/turtle_dove.pdf
- Macke, T. (1980): Zu Verbreitung, Bestand und Ökologie der Zippammer (*Emberiza cia*) im Rheinland. *Charadrius* 16: 5-13.
- Madge, S. & H. Burn (1989): Wassergeflügel. Paul Parey Verlag, Hamburg, Berlin.
- Madsen, J., G. Cracknell & A.D. Fox (1999): Goose populations of the Western Palearctic. A review of status and distribution. *Wetlands International Publ. No. 48*, Wetlands International, Wageningen, Niederlande. National Environmental Research Institute, Rönne, Dänemark.
- Mammen, U. & M. Stubbe (2009): Aktuelle Trends der Bestandentwicklung der Greifvogel- und Eulenarten Deutschlands. In: Stubbe M. & U. Mammen (Hrsg.): *Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten* 6: 9-25.
- Marchant, J.H., R. Hudson, S.P. Carter & P. Whittington (1990): Population trends in British birds. *British Trust for Ornithology, Tring*.
- Marti, C. & C. Breitenmoser-Würsten (1991): Nestlingsnahrung und Fütterungsfrequenz der Bergstelze *Motacilla cinerea* im Saanenland. *Ornithol. Beob.* 88: 265-285.
- Martinez, N. (2011): Erfolgreiche Brut der Haubenmeise *Parus cristatus* in einem nahezu nadelholzfreien Siedlungsgebiet. *Ornithol. Beob.* 108: 345-348.
- Martinez, N., L. Jenni, E. Wyss & N. Zbinden (2010): Habitat structure versus food abundance: the importance of sparse vegetation for the common redstart *Phoenicurus phoenicurus*. *J. Ornithol.* 151: 297-307.
- Marxmeier, U. & H. Düttmann (2002): Röhrichsterben beeinflusst Brutverhalten des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) am Dümmer (Niedersachsen, Deutschland). *J. Ornithol.* 143: 15-32.
- Mason, P. & J. Allsop (2009): *The Golden Oriole*. T & AD Poyser, London.
- May, B. & K. Blumenkamp (2005): Erstnachweis einer Brut des Bienenfressers *Merops apiaster* im Kreis Mettmann 2005. *Charadrius* 41: 208-213.
- Mayr, C. (1984): Zur Habitat- und Singwartenwahl des Sumpfrohrsängers (*Acrocephalus palustris*). *Charadrius* 20: 172-177.
- Mayr, C. (1986): Häufigkeit, Voraussetzungen und Ursachen von Mehrfachbruten des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*). *Charadrius* 22: 55-68.
- Mayr, C. (2009): 30 Jahre EG-Vogelschutzrichtlinie – Rückblick und Lehren für die Zukunft des Vogelschutzes. *Ber. Vogelschutz* 46: 21-39.
- Mebs, T. (1985): Das Haselhuhn in Nordrhein-Westfalen. *LÖLF-Mitt.* 3/1985: 41.
- Mebs, T. (1987): *Eulen und Käuze*. 6. Aufl., Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart.
- Mebs, T. (1994): Ergebnisse der Bestandserhebung Steinkauz (*Athene noctua*) in Nordrhein-Westfalen 1993. Unveröff. Manuskript der Vogelschutzswarte in der LÖBF/LafAO.
- Mebs, T. & G. Nicklaus (2011): Brutvorkommen der Zwergohreule *Otus scops* in Deutschland. Unveröff. Manuskript.
- Mebs, T. & A. Rothländer (1997): Die Bestandentwicklung der Schleiereule (*Tyto alba*) in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum der Jahre 1991 bis 1993. Versuch einer Hochrechnung. *Eulen-Rd.blick* 46: 11-16.
- Mebs, T. & W. Scherzinger (2008): *Die Eulen Europas*. Überarbeitete und aktualisierte Ausgabe. Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart.
- Mebs, T. & D. Schmidt (2006): *Greifvögel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens*. Kosmos-Verlag, Stuttgart.
- Mebs, T., H. Klinger & T. Hübner-Misiak (1993): Der Kormoran in Nordrhein-Westfalen. *LÖLF-Mitt.* 4/1993: 44-48.
- Mebs, T., R. Möckel, D. Gruber & M. Jöbges (1997): Zur aktuellen Verbreitung und Bestandssituation des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) in Deutschland. *Vogelw. Umw.* 9: 5-31.
- Meckling, L. (2000): Das Aktionskomitee „Rettet die Weißstörche im Kreis Minden-Lübbecke“ e.V. In: Bense, A.R. (Hrsg.): *Altes Storchland an Weser, Bastau und Dümmer*. Hüllhorst Edition Stadt und Buch: 204-206.
- Melter, J. (2004): Bestandssituation der Wiesenlimikolen in Niedersachsen. In Krüger, T. & P. Südbeck (Hrsg.): *Wiesenvogelschutz in Niedersachsen*. *Nat.schutz Landschaftspf. Niedersachs.* 41: 10-23.
- Meßer, J. (1990): Säbelschnäblerbrut in der Walsumer Rheinaue (Stadt Duisburg). *Charadrius* 26: 55.
- Meßer, J., M. Kladny, G. Schmitz & W. Hingmann (1995): Auswirkungen von Bergsenkungsgebieten auf den Brutvogelbestand im Naturschutzgebiet „Rheinaue Walsum“ (Stadt Duisburg). *Charadrius* 31: 44-52.
- Meyer, B.C. & S.R. Sudmann (1996): Bruterfolg einer wachsenden Sturm-
möwen-Population in Nordrhein. *Charadrius* 32: 191-196.
- Meyer, B.C. & S.R. Sudmann (1999a): Bestandentwicklung der Flußseeschnäbel in NRW. *LÖBF-Mitteilungen* 2/1999: 67-72.
- Meyer, B.C. & S.R. Sudmann (1999b): Erfolgreicher Einsatz künstlicher Nisthilfen für Flußseeschnäbel (*Sterna hirundo*) in Mitteleuropa. *Charadrius* 35: 92-99.
- Meyer, B.C. & S.R. Sudmann (2000): Flusseeeschnäbel: Erfolgreiche Überbrückungshilfe im Binnenland. *Falke* 47: 328-334.
- Meyer, B.C. & S.R. Sudmann (2005): Kiebitze im Kreis Kleve – häufiger als man denkt. *Nat.schutz Kreis Kleve* 2/2005: 13-14.
- Meyer, B.C. & S.R. Sudmann (2010): Flusseeeschnäbelprojekt in Nordrhein: Ergebnisbericht für das Jahr 2010. Unveröff. Bericht, Kranenburg.
- Michaelis, H. (1989): Der Ausbreitungsstand der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) im Kreis Steinfurt (Westfalen). *Charadrius* 25: 94-98.
- Michaelis, H. (1998): Brut des Austernfischers (*Haematopus ostralegus*) auf dem Flachdach eines Schulgebäudes in Mettingen, Kreis Steinfurt. *Charadrius* 34: 57-59.
- Michaelis, H. (2011): Beobachtungen zum Verhalten eines Haubenmeisen-Paares *Parus cristatus* während des Höhlen- und Nestbaus. *Charadrius* 47: 49-53.
- Michels, H. (1992): Zur Situation der Verbreitung des Halsbandsittichs (*Psittacula krameri*) im Raum Düsseldorf. *Charadrius* 28: 195-196.
- Michels, C. (2007): Landesweite Erfolgskontrollen des Vertragsnaturschutzes – Ergebnisse aus über 15-jährigen Untersuchungen in Nordrhein-Westfalen. *Nat.schutzmitt.* 1/2007: 29-35.
- Michels, C. & J. Weiss (1996): Effizienzkontrolle des Feuchtwiesenschutzprogrammes NRW anhand der Bestandentwicklung von Wiesenvögeln. *LÖBF-Mitt.* 2/1996: 17-27.
- Mildenberger, H. (1952): Zunahme und Ausbreitung einiger Vögel am Niederrhein. *Bonn. zool. Beitr.* 3: 40.
- Mildenberger, H. (1955): *Ornithologisches vom Niederrhein*. *Ornithol. Mitt.* 7.
- Mildenberger, H. (1958): Zur Ökologie und Brutbiologie des Rohrschwirls (*Locustella luscinioides*). *J. Ornithol.* 99: 92-99.
- Mildenberger, H. (1964): Untersuchungen über die Bestandsdichte der Raubvögel im Amtsbezirk Schermbeck 1961 bis 1963. *Niederrhein* 31: 4-6.
- Mildenberger, H. (1982): *Die Vögel des Rheinlandes*, Bd. 1: Seetaucher bis Alken (*Gaviiformes – Alcidae*). *Beitr. Avifauna Rheinland* 16-18. Düsseldorf.
- Mildenberger, H. (1984): *Die Vögel des Rheinlandes*. Band 2, Papageien bis Rabenvögel (*Psittaculidae – Corvidae*). *Beitr. Avifauna Rheinland Heft* 19-21. Düsseldorf.
- Mildenberger, H. & W. Müller (1976a): Zum gegenwärtigen Brutvorkommen der Heidelerche (*Lullula arborea*) im rechtsrheinischen Teil des Kreises Wesel. *Charadrius* 12: 58-60.
- Mildenberger, H. & W. Müller (1976b): Zum Brutbestand des Ortolans (*Emberiza hortulana*) am rechten unteren Niederrhein. *Charadrius* 12: 60-63.
- Mitschke, A. & S. Baumung (2001): *Brutvogel-Atlas Hamburg*. *Hambg. avifaun. Beitr.* 31: 1-344.
- Mitschke, A., C. Sudfeldt, H. Heidrich-Riske & R. Dröschmeister (2005): Das neue Brutvogelmonitoring in der Normallandschaft Deutschlands – Untersuchungsgebiete, Erfassungsmethode und erste Ergebnisse. *Vogelwelt* 126: 127-140.
- MKULNV [Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW] (2010): *Natur im Wandel – Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt in Nordrhein-Westfalen*. Düsseldorf.
- MKULNV [Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW] (2011): *Dienstanweisung zum Artenschutz im Wald und zur Beurteilung der Unbedenklichkeit von Maßnahmen in NATURA 2000 Gebieten im landeseigenen Forstbetrieb v. 11.06.2010*.
- Möckel, R. (1996): Arealveränderungen des Rauhfußkauzes *Aegolius funereus* im Osten Deutschlands. *Vogelwelt* 117: 57-66.

- Möller, D. (1997): Bodennest der Rabenkrähe (*Corvus corone*) in einer Wiesenfläche auf der Halbinsel Salmorth, Kr. Kleve. *Charadrius* 33: 224-225.
- Möller, D. (1998): Brutvorkommen der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in Ackerflächen. *Charadrius* 34: 60-63.
- Möller, E. (1987): Bereits um 1951 Brutnachweis der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) in Westfalen. *Charadrius* 23: 220-222.
- Mönig, R. (1979): Wasseramsel, Eisvogel und Gebirgsstelze – Charaktervogelarten der Bäche um Wuppertal. In: Kolbe, W. (Hrsg.): Wuppertal, Natur und Landschaft: 88-94.
- Mönig, R. (1991): Die Indikatorqualität der Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*) zum rückstandsanalytischen Nachweis von polychlorierten Biphenylen (PCBs). In: VDI Berichte 901: Bioindikation – Ein wirksames Instrument der Umweltkontrolle. Internationales Kolloquium, Wien.
- Mönig, R. (1995): Erfahrungen mit Nisthilfen für den Eisvogel (*Alcedo atthis*) im Bergischen Land. *Artenschutzreport* 5: 48-51.
- Mönig, R. (2006): Bestandsentwicklung des Steinkauzes *Athene noctua* und Schutzmaßnahmen im Raum Wuppertal. *Charadrius* 42: 192-197.
- Mönig, R. (2012): Was macht der Klimawandel mit einem Vogel, der nicht zieht? Zur aktuellen Bestandssituation der Wasseramsel (*Cinclus cinclus aquaticus*) im Bergischen Land – Vom Charaktervogel zur Rarität? *Jber. Naturwiss. Verein* 62: 115-130.
- Monaghan, P. & J.C. Coulson (1977): Status of Large Gulls Nesting on Buildings. *Bird Study* 24: 89-104.
- Mooij, J.H. (1997): Bestandsentwicklung einiger Grünland-Vogelarten der Rheinvorland-Naturschutzgebiete im Raum Xanten (Kreis Wesel, NRW) von 1978-1996. *Charadrius* 33: 157-178.
- Mooij, J.H. (2006): Bestand und Bestandsentwicklung von Rabenvögeln im Raum Xanthen (Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen). *Charadrius* 42: 56-69.
- Mooij, J.H. & R. Bräsecke (2000): Zur Brutbiologie der Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*) im Kreis Wesel. *Charadrius* 36: 25-35.
- Morris, A.J., C.M. Bailey, R. Winspear, D.J. Gruar & I.A. Dillon (2010): Drivers of population increase on an arable farm delivering a comprehensive suite of measures for farmland birds. *Aspects Applied Biology* 100: 201-209.
- Müller, E. (1961): Die Vogelwelt im südwestlichen Ennepe-Ruhr-Kreis. 1. Bericht. *Beitr. Heimatkd. Stadt Schwelm N.F.* 11: 5-42.
- Müller, W. (1977): Die Brutbestände der Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*) und der Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) von 1970-1976 im Rheinland. *Charadrius* 13: 20-23.
- Müller, E. (1985): Nachweise des Birkenzeisigs (*Carduelis flamma*) 1984 im südlichen Teil des Ennepe-Ruhr-Kreises. *Charadrius* 21: 151-152.
- Müller, W.R. (1995): Brutbestände und Bestandsveränderungen einiger gefährdeter Vogelarten in ausgewählten Probeflächen am Unteren Niederrhein. *Charadrius* 31: 163-171.
- Müller, W.R. (1996): Die Brutbestandsentwicklung der Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*) von 1983-1991 am Niederrhein. *Charadrius* 32: 24-28.
- Müller, W. (1977): Der Brutbestand der Brandgans (*Tadorna tadorna*) am unteren Niederrhein 1977. *Charadrius* 13: 111-114.
- Müller, A. (2001): Wachtelkönig und Windstromindustrie am Haarstrang – erste Analyse eines Konflikts. Studie im Auftrag der Vogelschutzswarte NRW, Soest.
- Müller, W.R. (2011): Zunehmender Weidelandverlust gefährdet Vögel und Säugetiere. *Nat. NRW* 4/2011: 39-42.
- Müller, A. & H. Illner (2001): Erfassung des Wachtelkönigs in Nordrhein-Westfalen 1998 bis 2000. *LÖBF-Mitt.* 2/2001: 36-51.
- Müller, W.R. & M. Steverding (2008): Erste Brutnachweise des Mittelspechtes (*Dendrocopos medius*) im nördlichen Niederrheinischen Tiefland und in der westlichen Westfälischen Bucht. *Charadrius* 45: 33-38.
- Müller, W.R. & W. Wißen (1992): Brutnachweise des Austernfischers (*Haematopus ostralgeus*) in den naturräumlichen Haupteinheiten Niers-Niederung, Issel-Ebene und Niederrheinische Sandplatten. *Charadrius* 28: 65-68.
- Müller, A., E. Kretzschmar & S. Glinka (1999): Avifaunistischer Jahresbericht 1998 für Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 35: 135-174.
- Mulhaupt, H. & M. Füller (2008): Ornithologischer Sammelbericht 2007 für den Kreis Lippe.
- MUNLV [Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen] (2007): Umweltbericht NRW 2006. Düsseldorf.
- MUNLV [Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen] (2009): Maßnahmenprogramm für die nordrhein-westfälischen Anteile von Rhein, Weser, Ems und Maas 2010-2015. Düsseldorf.
- Nationalpark Eifel (2011): Digitale Artenliste. www.nationalpark-eifel.de, letzter Zugriff 22.02.2011.
- Naturschutzzentrum im Kreis Kleve (2004): Artenschutzprojekt Steinkauz – Projektbericht 1996-2003. Eigenverlag, Rees.
- Neubaur, F. (1922): Die Zaunammer (*Emberiza cirius*) bei Bonn. *Ornithol. Monatsber.* 30: 130-131.
- Neubaur, F. (1957): Beiträge zur Vogelfauna der ehemaligen Rheinprovinz. *Decheniana* 110: 1-278.
- Neugebauer, R. (1992): Zwanzig Jahre Wasservogelzählungen im NSG Halterey in Dortmund (1968-1987). *Dortmunder faun. Mitt.* 4: 15-21.
- Neumann, T. (2008): Der Kranich als Leitart für die Erhaltung und Entwicklung von Feuchtwäldern in Schleswig-Holstein. *Ber. Vogelschutz* 45: 89-95.
- Nicolai, B. (1993): Atlas der Brutvögel Ostdeutschlands. Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart.
- Niehues, F.-J. & M. Schwöppe (2001): Die Trauerseeschwalbe: eine vom Aussterben bedrohte Art. *LÖBF-Mitt.* 2/2001: 28-35.
- Niehuis, M. (1978): Zum Vorkommen von Raubwürger (*Lanius excubitor*) und Rotkopfwürger (*Lanius senator*) bei Bad Kreuznach. *Beitr. Landespflege Rheinl.-Pfalz* 6: 39-52.
- Niehuis, M., C. Dietzen & G. Freundlieb (2003): Erster Brutnachweis der Zwergohreule (*Otus scops*) in Rheinland-Pfalz (Dritter Brutnachweis für Deutschland). *Fauna Flora Rheinl.-Pfalz* 10: 149-156.
- Niemann, P. (2007): Sie kommt aus dem Süden: Die Zwergohreule von Köln. www.nwo-avi.com/monatsvogel/apr07.html (aufgerufen 03.08.2011).
- Niermann, H. G. (1968): Erfolgreiche Brut der Sturmmöwe in Westfalen. *Anthus* 5: 113-115.
- Niethammer, G. (1963): Die Einbürgerung von Säugetieren und Vögeln in Europa. Paul Parey Verlag, Hamburg, Berlin.
- Niethammer, G. (1976): Die Türkentaube. *Charadrius* 12: 24-31.
- Nitsche, G. & H. Plachter (1987): Atlas der Brutvögel Bayers 1979-1983. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz, München.
- NLWKN [Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz] (2010): Lebensraumsprüche, Verbreitung und Erhaltungsziele ausgewählter Arten in Niedersachsen – Teil 1: Brutvögel. Informationsdienst Naturschutz Niedersachs. 30: 85-160.
- Nockemann, C. & H.G. Pfennig (1991): Bestandsentwicklung des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Ebbegebirge und Analyse seiner Kleinsäugerbeute. *Charadrius* 27: 205-214.
- Noormann, H. (2000): Überwinternde Kanadagänse *Branta canadensis* in der Umgebung der Rieselfelder Münster. *Jahresber. Biol. Stat. „Rieselfelder Münster“* 3: 13-17.
- NWO [Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft] (2000): Avifaunistischer Jahresbericht 1999 für Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 36: 143-200.
- NWO [Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft] (Hrsg.) (2002): Die Vögel Westfalens. Ein Atlas der Brutvögel von 1989 bis 1994. *Beitr. Avifauna NRW* Bd. 37, Bonn.
- OAG Kreis Viersen (2009): Ornithologischer Jahresbericht für den Kreis Viersen 2007. 12. Jahrg., Nettetal.
- OAG Kreis Viersen (2010): Ornithologischer Jahresbericht für den Kreis Viersen 2008. 13. Jahrg., Nettetal.
- OAG Kreis Viersen (2011): Ornithologischer Jahresbericht für den Kreis Viersen 2009. 14. Jahrg., Nettetal.
- OAG Kreis Viersen (2012): Ornithologischer Jahresbericht für den Kreis Viersen 2010. 15. Jahrg., Nettetal.
- OAG Kreis Unna (2000): Die Brutvögel des Kreises Unna. Ergebnisse der Gitterfeldkartierung 1997-1999. Unna.
- OAG Münster (1975): Brut der Brandgans (*Tadorna tadorna*) in Westfalen. *Alcedo* 2: 109-128.
- OAG Münster (1992): Zur Situation des Kiebitzes *Vanellus vanellus* im nördlichen Münsterland: Teilaspekte einer Rasterkartierung. *Vogelwelt* 113: 113-121.
- Oberwelling, C. & K. Nottmeyer-Linden (2009): Praktische Schutzmaßnahmen für Feldvögel. *Nat. NRW* 3/2009: 31-33.
- Oelke, H. (1985): Vogelbestände einer niedersächsischen Agrarlandschaft 1961 und 1985. *Vogelwelt* 106: 246-255.
- Olthoff, M. (2009): Die Vögel (Vertebrata, Aves) des Truppenübungsplatzes Haltern-Borkenberge (Kreise Coesfeld und Recklinghausen). In: Hannig, K., M. Olthoff, K. Wittjen & T. Zimmermann (Hrsg.): Die Tiere, Pflanzen und Pilze des Truppenübungsplatzes Haltern-Borkenberge (Kreise Coesfeld und Recklinghausen): Abh. Westfälisch. Museum Naturkd. 71: 149-170.
- Ormerod, S.J., N. Allinson, D. Hudson & S.J. Tylor (1986): The distribution of breeding dippers *Cinclus cinclus* (L.); Aves in relation to stream acidity in upland Wales. *Freshwat. Biol.* 16: 501-507.
- Ortlieb, R. (1989): Der Rotmilan. *NBB* 532. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt.
- Osing, H. (1993): Der Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*). *Bibliothek Natur & Wissenschaft*, Bd. 1. Verlag Natur & Wissenschaft, Solingen.
- Oswald, H. (1992): Eine neue Brutpopulation des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Norden des Kreises Olpe. *Charadrius* 28: 147-148.
- Otte, K. (2000): Analyse der westfälischen Weißstorchpopulation 1960-1999. In: Bense, A.R. (Hrsg.): Altes Storchland an Weser, Bastau und Dümmer. Hüllhorst: Edition Stadt und Buch: 182-190.
- Ouweneel, G.L. (2001): Snelle groei van de broedpopulatie Brandganzen *Branta leucopsis* in het Deltagebied. *Limosa* 74: 137-146.

- Owen, M. & J.M. Black (1999): Barnacle Goose *Branta leucopsis*. In: Madson, J., G. Cracknell & A.D. Fox (Hrsg.): Goose populations in the Western Palearctic. A review of status and distribution. Wetlands International publication 48: 258-268. Wetlands International, National Environmental Research Institute, Wageningen, Rönne.
- Pärt, T. (2001a): The effects of territory quality on age-dependent reproductive performance in the northern wheatear, *Oenanthe oenanthe*. *Animal Behaviour* 62: 379-388.
- Pärt, T. (2001b): Experimental evidence of environmental effects on age-specific reproductive success: the importance of resource quality. *Proceedings of the Royal Society, Series B* 268: 2267-2271.
- Pätzold, R. (1983): Die Feldlerche. NBB 323. 4. Aufl. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt.
- Pardey, A. (2004): Dünen und Sandlandschaften in Nordrhein-Westfalen unter besonderer Berücksichtigung der Situation in Westfalen. Dünen und trockene Sandlandschaften. Gefährdung und Schutz. Westfälischer Naturwissenschaftlicher Verein e.V., Münster: 3-11.
- Pasinelli, G. (2007): Nest site selection in middle and great spotted woodpeckers *Dendrocopos medius* & *D. major*: implications for forest management and conservation. *Biodiversity and Conservation* 16: 1283-1298.
- Pasinelli, G. & J. Hegelbach (1997): Characteristics of trees preferred by foraging middle spotted woodpecker *Dendrocopos medius* in northern Switzerland. *Ardea* 85: 203-209.
- Pasinelli, G., M. Schaub, G. Häfliger, M. Frey, H. Jakober, M. Müller, W. Stauber, P. Tryjanowski, J.-L. Zollinger & L. Jenni (2010): Impact of density and environmental factors on population fluctuations in a migratory passerine. *J. Animal Ecology*. doi: 10.1111/j.1365-2656.2010.01754.x.
- PECBMS [Pan-European Common Bird Monitoring Scheme] (2011): Population Trends of Common European Breeding Birds 2011. CSO, Prague, Czech Republic. [Grafiken unter <http://www.ebcc.info/trends2011.html>]
- Peitzmeier, J. (1969): Avifauna von Westfalen. Abh. Landesmus. Naturkd. Münster 31, Heft 3: 1-395.
- Peitzmeier, J. (1975): Neue ornithologische Beobachtungen von den Rietberger Fischteichen. *Natur und Heimat* 35: 58-60.
- Peitzmeier, J. (1979): Avifauna von Westfalen. 2. unveränderte Aufl. Abh. Westf. Landesmus. Naturkd. Münster 41: 1-576.
- Pennekamp, A. & J. Bellebaum (2003): Siedlungsdichte und Bestandsentwicklung der Elster (*Pica pica*) am Nordrand des Ruhrgebietes: Ergebnisse einer großflächigen Nestkartierung. *Charadrius* 39: 126-137.
- Petrak, M. & J. Eylert (2011): Erläuterungen zur Jagdstrecke für das Jagdjahr 2009/2010. Rheinisch-Westfälischer Jäger 65 (1): 10-11.
- Petry, W. (1937): Zum Vorkommen der Zaunammer im Rheingebiet. *Decheniana* 95B: 147-156.
- Pfennig, H.G. (1983): Bruten der Reiherente (*Aythya fuligula*) auf schwimmenden Inseln eines Klärteiches in Werdohl (Märkischer Kreis). *Charadrius* 19: 129-131.
- Pfennig, H.G. (1984): Der Birkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*) als Brutvogel Lüdenscheids. *Charadrius* 20: 48-51.
- Pfennig, H.G. (1985): Versuche zur Wiederansiedlung der Dohle (*Corvus monedula*) in Lüdenscheid. *Charadrius* 21: 7-8.
- Pfennig, H.G. (1986a): Graureiherkolonie am Lennestau Wilhelmstal (westl. Sauerland). *Charadrius* 22:12-15.
- Pfennig, H.G. (1986b): Zum Verhalten des Fichtenkreuzschnabels (*Loxia curvirostra*). *Charadrius* 22: 221-226.
- Pfennig, H.G. (1990): Die Bestandsentwicklung des Graureihers (*Ardea cinerea*) im mittleren Lennetal. *Charadrius* 26: 87-91.
- Pfennig, H.G. (1992): Extrem hohe Siedlungsdichte des Rauhußkauzes (*Aegolius funereus*) 1991 im Ebbegebirge. *Charadrius* 28: 149-150.
- Pfennig, H.G. (1995): Erfolgreiche Nistkastenbrut des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) im Ebbegebirge. *Charadrius* 31: 126-129.
- Pfennig, H.G. & D. Schmidt (2010): Die Tafelente (*Aythya ferina*) im westlichen Sauerland – Anstieg und Rückgang der Winterbestände, erste Brutnachweise. *Sauerländische Naturbeob.* 31: 124-128.
- Pleines, S. (2009): Haben Blaukehlchen im Vogelschutzgebiet „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“ (Kreis Viersen) Probleme mit Wildschweinen? Tagungsband Arnberger Umweltgespräche 2009: Tiere erobern neue Lebensräume – Schutz oder Regulierung sich ausbreitender Arten? Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU, Hrsg.): 93-102.
- Pleines, S. (2011): Biologische Station Krickenbecker Seen. Standardisierte Datenreihe 1992 bis 2010; unveröffentlicht.
- Pleines, S. & M. Jöbges (2010): Verbreitung, Bestand und Habitatwahl des Weißsternigen Blaukehlchens *Luscinia svecica cyanecula* in Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 46: 116-127.
- Pleines, S. & A. Reichmann (2004): D as EU-Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg. *Charadrius* 40: 177-187.
- Pohl, B. (1986): Vernichtung des Brutbaumbestandes der Saatkrähen-Kolonie („Vogel des Jahres 1986“) in Erwitte, Kreis Soest, durch die Firma Miebach – Zementwerk Wittekind. *Charadrius* 22: 53-54.
- Polley, H., P. Hennig & F. Kroihner (2009a): Ergebnisse einer Kohlenstoffinventur auf Bundeswaldinventur-Basis – Baumarten, Altersstruktur und Totholz in Deutschland. *AFZ Wald* 64 (20): 1074-1075.
- Polley, H., P. Hennig, F. Schwitzgebel (2009b): Ergebnisse einer Kohlenstoffinventur auf Bundeswaldinventur-Basis – Holzvorrat, Holzzuwachs, Holznutzung in Deutschland. *AFZ Wald* 64 (20): 1076-1078.
- Pollmann, H. (1988): Brutnachweis der Englischen Schafstelze (*Motacilla flava flavissima*) am Unteren Niederrhein. *Charadrius* 24: 12-14.
- Porter, W.F. (1994): Family Meleagrididae (Turkeys). In: del Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (Hrsg.): *Handbook of the birds of the world*. Vol. 2. Lynx Edicions, Barcelona: 364-375.
- Potts, G.R. (1986): *The Partridge: Pesticides, Predation and Conservation*. London.
- Potts, G.R. (1997): Cereal farming, pesticides and Grey Partridge. In: Pain, D.J. & M.W. Pienkowski (Hrsg.): *Farming and Birds in Europe*: 151-177. Academic Press, San Diego.
- Prange, H. (2009): *Das Kranichjahr 2008*. Wissenschaftliche Berichte zum Grauen Kranich, Bd. 10. AG Kranichschutz Deutschland, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
- Prange, H. & T. Raus (2010): Zug und Rast des Kranichs *Grus grus* und die Veränderungen in vier Jahrzehnten. *Vogelwelt* 131: 155-167.
- Preiss, H.-G. (1996): Erster Brutnachweis der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) im Kreis Mettmann. *Charadrius* 32: 85-86.
- Prünze, W. & T. Raus (1970): Über das Vorkommen des Wachtelkönigs in Mittelwestfalen. *Anthus* 7: 1-6.
- Przygodna, W. (1969): Die Bestandsentwicklung des Rauhußkauzes (*Aegolius funereus*) in den letzten Jahren in Westfalen. *Natur und Heimat* 29: 1-4.
- Przygodna, W. (1988): Die Vögel von Essen und Mülheim an der Ruhr. *Beitr. Avifauna Rheinland* 29.
- Püchel-Wieling, F., B. Walter, N. Anthes, B. Beckers, C. Sudfeldt & S.R. Sudmann (2002): Brutbestände von Bekassine, Uferschnepfe, Großem Brachvogel und Rotschenkel 2000 in Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 38: 219-231.
- Quelle, M. & W. Lemke (1988): Strukturanalyse von Waldlaubsängerrevieren (*Phylloscopus sibilatrix*) in Westfalen. *Charadrius* 24: 196-213.
- Rade, E. & H. Landois (1886): *Die Vogelwelt Westfalens*. In: Landois, H. (Hrsg.) (1886): *Westfalen Tierleben in Wort und Bild*, Bd. 2. Paderborn, Münster.
- Radermacher, W. (1977): *Die Vogelwelt im Bergischen Land im Raume Neunkirchen-Seelscheid*. *Beitr. Avifauna Rheinland* 9. Düsseldorf.
- Raethel, H.-S. (1988): *Zier- und Hausenten*. Gräfe & Unzer Verlag, München.
- Rajchard, J., J. Procházka & P. Kindlmann (2006): Long-term decline in the Common Swift *Apus apus* annual breeding success may be related to weather conditions. *Ornis Fennica* 83: 66-72.
- Ransom jun., D., R.L. Honeycutt & R.D. Slack (2001): Population southeastern Wood ducks. *J. Wildl. Manage.* 65: 745-754.
- Raven, S.J. & J.C. Coulson (1997): The distribution and abundance of Larus gulls nesting on buildings in Britain and Ireland. *Bird Study* 44: 13-34.
- Raus, T. (1971): Das invasionsartige Auftreten von Sumpfohreulen (*Asio flammeus*) in Westfalen 1970/71. *Anthus* 8: 73-77.
- Rebling, H. & R. Tüllinghoff (2007): *Wiesenweihenschutz in Südwest-Niedersachsen*. *Feuchtwiesen-Info* 8: 8-10.
- Regulski, D. (1978): Interessante Brut von Zaunkönig und Grauschnäpper. *Charadrius* 14: 104-105.
- Regulski, D. (2010): *Wie Phönix aus der Asche*. Der Uhu im niederbergischen Raum. Kreis Mettmann. Erfolge des Naturschutzes. Unveröff. Manuskript.
- Reichholf, J.H. (2005): *Die Zukunft der Arten*. Neue ökologische Über-raschungen. München.
- Reichholf, J.H. (2006): *Klimaerwärmung: Wie reagieren wärmeliebende Vogelarten in Bayern?* *Ornithol. Mitt.* 58: 76-82.
- Reichling, H. (1915/16): Beiträge zur Vogelfauna des Münsterlandes. Jahres-(Sitzungs-)Berichte der Zoologischen Sektion des Westf. Provinzial-Vereins für Wissenschaft u. Kunst, Münster (S.Z.S.) 44: 154-168.
- Reichling, H. (1932): Beiträge zur Ornithologie Westfalens und des Emslandes. *Abh. Westf. Prov. Mus. Nat.kd.* 3: 307-362.
- Renkhoff, M. (1973): Zum Brutbestand des Teichrohrsängers (*Acrocephalus scirpaceus*) am unteren Rurlauf in den Jahren 1969-1972. *Charadrius* 9: 130-131.
- Reul, M. (1989): Das interspezifische Aggressionsverhalten der Bleßralle (*Fulica atra*), seine Ursachen und Auswirkungen auf andere Wasservögel. *Charadrius* 25: 113-119.
- Rheinhardt, A. (2003): *Habitatwahl und Brutbiologie beim Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) im Bodenseegebiet im Hinblick auf den derzeitigen Bestandsrückgang*. Dipl.-Arbeit, Universität Konstanz; www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2004/1177/pdf/Diplomarbeit_Arno_Reinhardt.pdf
- Reinhardt, A. & H.-G. Bauer (2009): Analyse des starken Bestandsrückgangs beim Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix* im Bodenseegebiet. *Vogel-warte* 47: 23-39.

- Rheinwald, G. (1971): Gewichtsentwicklung nestjunger Mehlschwalben (*Delichon urbica*) bei verschiedenen Witterungsbedingungen. *Charadrius* 7: 114-120.
- Rheinwald, G. (1979): Brutbiologie der Mehlschwalbe (*Delichon urbica*) im Bereich der Voreifel. *Vogelwelt* 100: 85-107.
- Rheinwald, G. (1993): Atlas der Verbreitung und Häufigkeit der Brutvögel Deutschlands – Kartierung um 1985. Schriftenreihe des DDA 12.
- Rheinwald, G. & S. Kneitz (2002): Die Vögel zwischen Sieg, Ahr und Erft. Ginster-Verlag, St. Katharinen.
- Rheinwald, G. & M. Schmitz (2007): Vögel zwischen Rhein und Weser. So wird Vogelbeobachtung zum Erlebnis. Ginster-Verlag, St. Katharinen.
- Rheinwald, G. & K. Schulze-Hagen (1972): Vergleichende Untersuchungen zur Gewichtsentwicklung von Rauch- und Mehlschwalbe (*Hirundo rustica*, *Delichon urbica*) bei verschiedenen Witterungsbedingungen. *Charadrius* 8: 74-81.
- Rheinwald, G., M. Wink & H.-E. Joachim (1984): Die Vögel im Großraum Bonn, Bd. 1: Singvögel. *Beitr. Avifauna Rheinland* 22/23.
- Rheinwald, G., M. Wink & H.-E. Joachim (1987): Die Vögel im Großraum Bonn, Bd. 2: Nicht-Singvögel. *Beitr. Avifauna Rheinland* 27/28.
- Riegel, J. (1993): Zum Vorkommen des Fichtenkreuzschnabels (*Loxia curvirostra*) im südlichen Bergischen Land unter besonderer Berücksichtigung der Flugaktivität während der Invasion 1990/91. *Charadrius* 29: 158-167.
- Ristow, D. (1968): Beobachtungen über die Brutvögel der Siegniederung. *Charadrius* 4: 76-107.
- Ristow, D. (1971): Zur Verbreitung und Brutbiologie des Rotkopfwürgers (*Lanius senator*) in der Eifel und in ihren Randgebieten. *Charadrius* 7: 97-100.
- Ristow, D. & M. Braun (1977): Der Raubwürger (*Lanius excubitor*) in der Eifel und im Westerwald. *Charadrius* 13: 33-59.
- Röder, H. (1989): Hohлтаuben in Nistkästen. *Natur- Tierschutz Dortmund* 4 (2): 36-37.
- Röder, H. (1992): Hohлтаubenbestand in Dortmund nimmt weiter zu. *Natur- Tierschutz Dortmund* 7 (2): 45-47.
- Römer, U. (1989): Zu Verfolgungssituation und Bestand der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) im Kreis Soest (Westfalen). *Charadrius* 25: 199-206.
- Rolshausen, G., G. Segelbacher, K. A. Hobson & H. M. Schaefer (2009): Contemporary Evolution of Reproductive Isolation and Phenotypic Divergence in Sympatry along a Migratory Divide. *Current Biology* 19: 2097-2101.
- Roth, N. & R. Barth (1984): Zusammenstellung der ornithologischen Einzelbeobachtungen des Jahres 1983 für das Saarland. *Lanius* 23: 119-198.
- RSPB [Royal Society for the Protection of Birds] (1990): *Gravel pit restoration for wildlife – a practical manual*. RSPB, Bedfordshire, UK.
- RSPB [Royal Society for the Protection of Birds] (2010): *The State of the UK's birds 2010*. <http://www.rspb.org.uk/>. Letzter Zugriff am 09.02.2011.
- Ruitenbeek, W., C.J.G. Scharringa & P.J. Zomerdijs (1990): *Broedvogels van Noord-Holland*. Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland & Prov. Bestuur van Noord-Holland, Assendelft.
- Rutschke, E. (1989): *Die Wildenten Europas: Biologie, Ökologie, Verhalten*. Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin, Berlin.
- Rutschke, E. (1992): *Die Wildschwäne Europas: Biologie, Ökologie, Verhalten*. Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin, Berlin.
- Rutz, C. (2001): *Raum-zeitliche Habitatnutzung des Habichts – Accipiter gentilis – in einem urbanen Habitat*. Dipl.-Arbeit, Univ. Hamburg.
- Rutz, C., R.G. Bijlsma, M. Marquiss & R.E. Kenward (2006): Population limitation in the Northern Goshawk in Europe: a review with case studies. *Studies in Avian Biology* 31: 158-197.
- Saino, N., D. Rubolini, E. Lehikoinen, L.V. Sokolov, A. Bonisoli-Alquati, R. Ambrosini, G. Boncoraglio & A.P. Moller (2009): Climate change effects on migration phenology may mismatch brood parasitic cuckoos and their hosts. *Biology Letters* 5: 539-541.
- Sanderson, F.J., P.F. Donald, D.J. Pain, I.J. Burfield & F.P.J. van Bommel (2006): Long-term population declines in Afro-Palaearctic migrant birds. *Biological Conservation* 131: 93-105.
- Sandke, C. (1992): Horste des Sperbers (*Accipiter nisus*) in Laubwaldbeständen auf Bochumer Stadtgebiet. *Charadrius* 28: 30-32.
- Sandke, C. & T. Stanco (2008): Der Sperber in Bochum (Ruhrgebiet)/Nordrhein-Westfalen. In: IGS (Hrsg.): *Der Sperber in Deutschland*: 117-134.
- Sartor, J. (1989): Erster Brutnachweis der Schafstelze (*Motacilla flava*) für den Kreis Siegen-Wittgenstein. *Charadrius* 25: 37.
- Sartor, J. (1995): Zweijährige Brutvogelkartierung in drei Grünlandkomplexen der Gemeinde Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein. *Beitr. Tier- u. Pflanzenwelt . Kreis Siegen-Wittgenstein* 3: 71-93.
- Sartor, J. (2004): Wiesenvögel auf dem Rückzug aus der Fläche. Bestandserfassung der Wiesenvögel im Altkreis Siegen. *Natur und Umwelt in Siegen-Wittgenstein* 12: 3-6.
- Sayer, M., H.J. Bittner, M. Körner, M. Schaefer, K. Dornieden, H. Illner, K. Lücke, A. Lutze & H. Nickel (2003): *Straßenbedingte Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt benachbarter Biotope*. *Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik* H. 865.
- Schacht, H. (1877): *Die Vogelwelt des Teutoburger Waldes*. Verlag Meyer-sche Hofbuchhandlung, Detmold.
- Schacht, H. (1885): *Aus dem Vogelleben der Heimat*. Ornithologische Vorträge. Detmold.
- Schäffer, N. (1994): Methoden zum Nachweis von Bruten des Wachtelkönigs. *Vogelwelt* 115: 69-73.
- Schäffer, N. (1999): Habitatwahl und Partnerschaftssystem von Tüpfelralle *Porzana porzana* und Wachtelkönig *Crex crex*. *Ökol. Vögel* 21: 1-267.
- Scharlau, W. (1967a): Der Haubentaucher (*Podiceps christatus*) in Eifel und Vorgebirge. *Charadrius* 3: 61-63.
- Scharlau, W. (1967b): Kleine Beiträge. *Charadrius* 3: 223.
- Scharlau, W. (1968): Das Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*) im Rheinland. *Charadrius* 4: 151-166.
- Scharlau, W. (1970): Krickente und Zwergrohrdommel im Braunkohlengebiet. *Charadrius* 6: 110.
- Schaub, M., N. Martinez, A. Tagmann-losset, N. Weisshaupt, M.L. Maurer, T.S. Reichling, F. Abadi, N. Zbinden, L. Jenni & R. Arlettaz (2010): Patches of Bare Ground as a Staple Commodity for Declining Ground-Foraging Insectivorous Farmland Birds. *PlosOne* Volume 5, Issue 10: e13115.
- Schekkerman, H., W. Teunissen & E. Oosterfeld (2008): The effect of 'mosaic management' on the demography of Black-tailed Godwit *Limosa limosa* on farmland. *J. Appl. Ecol.* 45: 1067-1075.
- Schekkerman, H., W. Teunissen & E. Oosterfeld (2009): Mortality of Black-tailed Godwit *Limosa limosa* and Northern Lapwing *Vanellus vanellus* chicks in wet grasslands: influence of predation and agriculture. *J. Ornithol.* 150: 133-145.
- Schelper, W. (1993): Birkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*) Brutvogel in Hannoversch-Münden. *Vogelkdl. Ber. Niedersachs.* 19: 88-89.
- Schidelko, K., A. Schröter & D. Stiels (2009): Erster Nachweis der Zaunammer (*Emberiza cirlus*) in Nordrhein-Westfalen nach fast 50 Jahren. *Charadrius* 45: 20-26.
- Schielzeth, H., C. Grüneberg & J. Wahl (2002): Brutvögel der Rieselfelder Münster im Jahr 2001. *Jahresber. Biol. Stat. „Rieselfelder Münster“* 5: 4-10.
- Schifferli, L. & J. Flousek (1985): *Motacilla cinerea* – Bergstelze. In: *Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer (Hrsg.): Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 10: 836-872. Aula-Verlag, Wiesbaden.
- Schleef, J. & B. Walter (2001): Brut- und Gastvögel nehmen Neuanlage von Gewässern an. *LÖBF-Mitt.* 2001/2: 52-56.
- Schlender, M., A. Skibbe, H. Kappes & R. Topp (2007): Complex responses of songbirds to soil acidification of managed Beech forests in Central Europe. *Ecosystems* 10: 579-587.
- Schlüppmann, M. (2007): Kanadagans *Branta canadensis* und Zwergkanadagans *B. hutchinsii* in Hagen – Beobachtungen bis 2005. *Charadrius* 43: 155-161.
- Schmidt, E. (1995): Bruten des Gauschnäppers (*Muscicapa striata*) in Nestern der Mehlschwalbe (*Delichon urbica*). *Anz. Ver. Thüring. Ornithol.* 2: 215.
- Schmidt, H. (1996): *Groß- und Wassergeflügel: Puten, Perlhühner, Gänse, Enten*. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- Schmidt, K. (2004): Vorkommen, Bestandssituation und Bruterfolg der Dohle *Corvus monedula* in Thüringen – Ergebnisse einer Bestandserfassung im Jahr 2002. *Anz. Ver. Thüring. Ornithol.* 5: 67-76.
- Schmiegel, R., J. Heimann & D. Buschmann (2010): Ornithologischer Sammelbericht für das südliche Bergische Land. *Berichtsh. Arbeitsgem. Bergisch. Ornithol.* 55: 19-74.
- Schmidtke, K., R. Pfeifer, J. Stadler & R. Brandl (2001): Bestandsschwankungen beim Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: Zunahme, Abnahme oder Zyklus? *Orn. Anz.* 40: 47-56.
- Schmitz, F. (1978): Brutvorkommen des Birkenzeisigs (*Carduelis flammea cabaret*) 1977 auch im Kreis Düren (Messtischblatt 5204, Kreuzau). *Charadrius* 14: 21-22.
- Schmitz, F. (1981): Der Birkenzeisig (*Carduelis flammea*) Brutvogel im Stadtgebiet von Aachen. *Charadrius* 17: 75.
- Schmitz, M. (1996): Veränderungen der Habitatqualität für Wasservögel durch Entschlammungs- und Entkrautungsmaßnahmen. *Charadrius* 32: 49-55.
- Schmitz, M. & H. Osing (1999): Auswirkungen der Errichtung von Wupper- und Großer Dhünn-Talsperre auf die Avifauna – Mit Anmerkungen zur Funktion der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. *Charadrius* 35: 41-60.
- Schmitz, M. & F. Sonnenburg (2006): Hohe Bestandsdichte des Teichhuhns (*Gallinula chloropus*) an Parkgewässern im Ballungsraum Rhein-Ruhr. *Jahresber. Nat.wiss. Ver. Wupp.* 59: 225-230.
- Schnickers, E. & D. Eberhardt (1960): *Vögel der Bislicher Insel*. *Gewässer und Abwässer* 28: 1-73.
- Schön, M. (1994): Kennzeichen des Raubwürger-Lebensraumes (*Lanius e. excubitor*) im Gebiet der südwestlichen Schwäbischen Alb: Jahreszeitliche Nutzung und Revier-Größe, Struktur-Merkmale und -Veränderungen, Kleinstrukturen und Bewirtschaftung. *Ökol. Vögel* 16: 253-495.

- Schönfeld, M. (1994): Die Beutelmeise. NBB 599. Westarp-Wissenschaften, Magdeburg.
- Schönfeld, M. (2002a): Untersuchungen zum Vorkommen und zur Höhenverbreitung von Wald- und Gartenbaumläufer im Süderbergland/NRW – Teil 1. Ornithol. Mitt. 54: 334-342.
- Schönfeld, M. (2002b): Untersuchungen zum Vorkommen und zur Höhenverbreitung von Wald- und Gartenbaumläufer im Süderbergland/NRW – Teil 2. Ornithol. Mitt. 54: 436-444.
- Scholz, M. (1997): Zur Bestandsentwicklung der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) in Nordrhein-Westfalen von 1956-1997. Charadrius 33: 209-213.
- Schott, M. (1997): Erfolgreiche Brut des Säbelschnäblers *Recurvirostra avo-setta* im NSG Rheinaue Walsum (Stadt Duisburg). Charadrius 33: 230.
- Schubert, W. (1977): Brutausfälle beim Wespenbussard (*Pernis apivorus*) in Baden-Württemberg. Anz. Orn. Ges. Bayern 16: 163-165.
- Schubert, W. & F.-J. Stein (1990): Eine Brut des Schwarzmilans (*Milvus migrans*) im Hochsauerlandkreis. Charadrius 26: 99-100.
- Schubert, W. & F.-J. Stein (1991): Erste Brut des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) in Westfalen nach 21 Jahren. Charadrius 27: 131-136.
- Schücking, A. (1963): Beobachtungen am Nest der Gebirgsstelze. Ornithol. Mitt. 15: 183.
- Schücking, A. (1991): Zunehmende Bevorzugung von Oberleitungsmasten der Bundesbahn als Brutplatz der Elster (*Pica pica*). Charadrius 27: 142-144.
- Schücking, A. (1992): Ein ungewöhnlich hoher und gefährvoller Neststand der Stockente (*Anas platyrhynchos*). Charadrius 28: 108-109.
- Schürmann, A.M.W. (1981): Deutschland – deine Papageien. Kosmos 8: 43-49.
- Schulz, H. (1999): Weißstorch im Aufwind? – White Stork on the up? Proc. Int. Symp. On the White Stork, Hamburg 1996 – NABU, Bonn.
- Schulze-Hagen, K. (1984a): Bruterfolg des Sumpfrohrsängers (*Acrocephalus palustris*) in Abhängigkeit von der Nistplatzwahl. J. Ornithol. 125: 201-208.
- Schulze-Hagen, K. (1984b): Habitat- und Nistplatzansprüche des Sumpfrohrsängers (*Acrocephalus palustris*) in der rheinischen Ackerbörde. Vogelwelt 105: 81-97.
- Schulze-Hagen, K. (1992): Parasitierung und Brutverluste durch den Kuckuck (*Cuculus canorus*) bei Teich- und Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*, *A. palustris*) in Mittel- und Westeuropa. J. Ornithol. 133: 237-249.
- Schulze-Hagen, K. (1993): Habitatansprüche und für den Schutz relevante Aspekte der Biologie des Teichrohrsängers. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 68: 15-40.
- Schulze-Hagen, K. (2004): Allmenden und ihr Vogelreichtum – Wandel von Landschaft, Landwirtschaft und Avifauna in den letzten 250 Jahren. Charadrius 40: 97-121.
- Schulze-Hagen, K. & W. Mädlow (1986): Brutstatistik des Sumpfrohrsängers bei wirtschaftlicher Nutzung des Habitats. Orn. Ber. Berlin 11: 19-26.
- Schumann, R., D. Steinwarz, J. Brune, J. Kranz, A. Skibbe & T. Zegula (2007): Reviererfassung von Rotmilan *Milvus milvus* und Schwarzmilan *M. migrans* im Jahre 2005 im Rhein-Sieg-Kreis. Charadrius 43: 13-21.
- Schuster, A. (2005): Ausgewählte Neozoen – Vögel. In: Wallner, R. (Red.): Aliens – Neobiota in Österreich. Grüne Reihe des Lebensministeriums 15: 121-132.
- Schwarthoff, H. (1974): Vögel im Jülicher Land. Beitr. Avifauna Rheinland 4: 1-309.
- Schwarthoff, H. (1995): Abgesang für die Escher Bürge – Bilanz einer häßlichen Schönheit. Charadrius 31: 64-71.
- Schwerdtfeger, O. (1987): Gesangsaktivität und Siedlungsdichte beim Waldbaumläufer und Gartenbaumläufer (*Certhia familiaris* u. *C. brachydactyla*). Beitr. Naturkde. Niedersachs. 40: 222-226.
- Schwerdtfeger, O. (1993): Ein Invasionsjahr des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Harz – eine populationsökologische Analyse und ihre Konsequenzen für den Artenschutz. Ökol. Vögel 15: 121-136.
- Schwöppe, M., B. Surholt & M. Hoffmann (1988): Zerstörung des Naturschutzgebietes Zwillbrocker Venn durch Massenansammlungen der Lachmöwe (*Larus ridibundus*). Nat. Landschaft 63: 14-19.
- Seifert, H. (1989): Bestandsaufnahme des Ziegenmelkers (*Caprimulgus europaeus*) auf dem Truppenübungs- und Schießplatz Haltern. Charadrius 26: 107-110.
- Setchfield, R.P., C. Mucklow, A. Davey, U. Bradter & G.Q.A. Anderson (2012): An agri-environment option boosts productivity of Corn Buntings *Emberiza calandra* in the UK. Ibis 154: 235-247.
- Sikora, A., Z. Rohde, M. Gromadzki, G. Neubauer & P. Chylarecki (Hrsg.) (2007): Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
- Skiba, R. (1993): Die Vogelwelt des Niederbergischen Landes. Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal, Beiheft 2.
- Skibbe, A. (2007): Ein methodisches Modell zur großflächigen Abschätzung der Vogelbestände. Dissertation, Zoologisches Institut der Universität zu Köln. Ginster-Verlag, St. Katharinen.
- Skibbe, A. (2009): Großflächige Bestandsaufnahme bei Greifvögeln am Beispiel des Mäusebussards. In: Stubbe, M. & A. Stubbe (Hrsg.): Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 6: 285-292.
- Skibbe, A. & S.R. Sudmann (2002): Bestandsaufnahme des Haussperlings (*Passer domesticus*) in Köln im Jahr 2002. Charadrius 38: 180-184.
- Skibbe, A. & S.R. Sudmann (2005): Bestand und Bestandsentwicklung des Zaunkönigs *Troglodytes troglodytes* in Nordrhein-Westfalen. Charadrius 41: 214-222.
- Skibbe, A., B. Gießing, K. Gießing, J.-D. Ludwigs, K. Schidelko, D. Stiels & C. Wolf (2009): Erste Ergebnisse der telemetrischen Untersuchungen an der Waldschnepfe *Scolopax rusticola* in der Wahner Heide. Kölner Ornithologische Berichte 1: 17-27.
- Söding, K. (1953): Vogelwelt der Heimat. Gefiederte Freunde im Industriegebiet und Münsterland. Recklinghausen.
- Sonneborn, D. (1976): Erster Nachweis des Birkenzeisigs (*Carduelis flammula* ssp.) in Westfalen. Alcedo 3: 23.
- Sonneborn, D. & W. Daus (1995): Brutnachweis des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) im Kreis Siegen-Wittgenstein. Charadrius 31: 130-132.
- Sonnenburg, F. & M. Schmitz (2006): Häufigkeitsanteile und Färbungsmerkmale fehlfarbener Stockenten *Anas platyrhynchos* im Ballungsraum Rhein-Ruhr. Charadrius 42: 9-22.
- Souiljee, R. (1983): Das Projekt „Künstliche Uferschwalben-Steilwände“ des Naturschutzverbandes Kreis Borken e.V. Charadrius 19: 149-151.
- SOVON [Vogelonderzoek Nederland] (1988): Vestiging van de Buidelmee *Remiz pendulinus* in Nederland: de ontwikkeling tot en met 1987. Limosa 61: 145-149.
- SOVON [Vogelonderzoek Nederland] (2002): Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland. Leiden, Niederlande.
- SOVON [Vogelonderzoek Nederland] (2012): Distribution and trends of birds in the Netherlands. <http://www.sovon.nl/nl/soorten>. Stand: 2.12.2012.
- Späth, T., V. Laske & A. Mitschke (2008): Brutvogelmonitoring im Nationalpark Harz (Niedersachsen) – Ergebnisse und Erfahrungen. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 181-199.
- Speer, G. (2009): Chronologie der Wanderfalkenbruten auf Schaufelradbaggern und Absetzern in den Tagebauen des Rheinischen Braunkohlengebietes. AGW-NRW, Jahresber. 2009: 12-16.
- Spittler, H. (1981): Wildtruthühner im Kottenforst. Wild Hund 84: 420-422.
- Spittler, H. (1985): Die Grauganseinbürgerung in Nordrhein-Westfalen. Niedersächsischer Jäger 4: 179.
- Spittler, H. (1993): Einbürgerungsversuche mit Wildtruthühnern (*Meleagris gallopavo* L.) in der Bundesrepublik Deutschland und ihr derzeitiges Vorkommen. Z. Jagdwiss. 39: 246-260.
- Splitter, H. (1994): Wiedereinbürgerungsveruch mit Auerwild (*Tetrao urogallus* L.) im Hochsauerland. Z. Jagdwiss. 40: 185-199.
- Spittler, H. (1998): 40 Jahre Wildtruthühner im Kottenforst. Rheinisch-Westfälischer-Jäger 52 (4): 16-17.
- Staedtler, K., K. Bremshey & I. Heynen (2003): Bestandsentwicklung der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) im Raum Schwerte zwischen 1981 und 2002 in Abhängigkeit vom Angebot unterschiedlicher Nisthilfen. Charadrius 39: 95-98.
- Stein, J. (1974): Das Haselhuhn, Kleinod unserer heimatischen Wälder. Heimatjb. Dillkreis 17: 13-23.
- Steiof, K. & H.-G. Bauer (1995): „Problemvögel“ – ungeliebte Vogelarten. Ber. Vogelschutz 33: 23-37.
- Stevens, D.K., G.Q.A. Anderson, P.V. Grice & K. Norris (2007): Breeding success of Spotted Flycatchers *Muscicapa striata* in southern England – is woodland a good habitat for this species? Ibis 149 (Suppl. 2): 214-223.
- Steverding, M. (2006): Bedeutung der Gebäudebrutplätze des Steinkauzes *Athene noctua* im Westmünsterland. Charadrius 42: 208-211.
- Stichmann, W. (1958): Der Fischreiher in Westfalen. Abh. Landesmus. f. Naturkd. 20: 3-28.
- Stichmann, W. (1962): Neues über den Graureiher in Westfalen. Nat. Heimat 22: 22-25.
- Stichmann, W. (1971): Neues über den Graureiher (*Ardea cinerea*) in Westfalen. 2. Nachtrag: Zeitraum 1962-1968. Anthus 8: 12-17.
- Stichmann, W. & U. Stichmann-Marny (1975): Bestandsentwicklung und Schutz des Graureihers in Westfalen. Mitt. Landesstelle Nat.schutz Landschaftspf. Nat. NRW 3 (3): 72-79.
- Stichmann, W. & U. Stichmann-Marny (2010): 50 Jahre Erfassung der Graureiher in Westfalen: Langzeituntersuchungen von 1957 bis 2009. Nat. NRW 1/2010: 27-28.
- Stichmann, W. & U. Stichmann-Marny (2012): Die Eiderente *Somateria mollissima* als Gast- und Brutvogel auf der Möhnetalsperre. Charadrius 48: 29-33.
- Stichmann, W., W. Prünke & T. Raus (1969): Beiträge zur Avifauna des Mönesees – quantitative und phaenologische Studien. Anthus 6: 45-148.

- Stickel, W. (1967a): Zum Vorkommen der Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*). Charadrius 3: 190-191.
- Stickel, W. (1967b): Zwei neue Brutplätze der Knäkente (*Anas querquedula*). Charadrius 3: 223.
- Stiebel, H. (1997): Habitatwahl, Habitatnutzung und Bruterfolge der Schafstelze *Motacilla flava* in einer Agrarlandschaft. Vogelwelt 118: 257-268.
- Stiefel, D. (2010): Zur Situation der Wiesenweihe *Circus pygargus* in Deutschland. Charadrius 46: 18-27.
- Stinglwagner, G.K.F., I.E. Haseder & R. Erlbeck (2009): Das Kosmos Wald- und Forst-Lexikon. 4. Aufl., Franckh-Kosmos, Stuttgart.
- Stoate, C. & J. Szczyr (2006): Potential influence of habitat and predation on local breeding success and population in Spotted Flycatchers *Muscicapa striata*: Capsule Breeding abundance in woodland increased following predator removal. Bird Study 53: 328-330.
- Strubbe, D. & E. Matthysen (2009): Establishment success of invasive ring-necked and monk parakeets in Europe. J. Biogeography 36: 2264-2278.
- Stucki, S. (2005): Rostgans: Entflogener Gehegevogel als Problem für Wildvogelarten. Merkblatt Nicht-einheimische Arten 1. Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, Zürich, und Schweizerische Vogelwarte, Sempach.
- Stumpf, T. (1994): Die Bestandssituation des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata*) in Nordrhein-Westfalen. Charadrius 30: 157-165.
- Stumpf, T. (2009): Feldlerche *Alauda arvensis* im Rheinisch-Bergischen Kreis vom Aussterben bedroht. Charadrius 45: 69-73.
- Südbeck, P., H.-G. Bauer, M. Boschert, P. Boye & W. Knief (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 4. Fassung, 30.07.2007. Ber. Vogelschutz 44: 23-81.
- Sudfeld, C. (1998): Neubürger in den Rieselfeldern – Die Kanadagans. Jahresber. Biol. Stat. „Rieselfelder Münster“ 2: 6-11.
- Sudfeldt, C. (2010): Europaweite Synchronzählungen. Falke 57, Sonderheft: 10-11.
- Sudfeldt, C., R. Dröschmeister, M. Flade, C. Grüneberg, A. Mitschke, J. Schwarz & J. Wahl (2009): Vögel in Deutschland – 2009. DDA, BfN, LAG VSW, Münster.
- Sudfeldt, C., R. Dröschmeister, T. Langgemach & J. Wahl (2010): Vögel in Deutschland – 2010. DDA, BfN, LAG VSW, Münster.
- Sudhaus, W. (1991): Nutzung von Gebäuden durch den Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*) zur Nahrungssuche, als Schlafplatz und zur Brut. Corax 14: 133-135.
- Sudmann, S.R. (1998a): Wie dicht können Flußseeschwalben brüten? Extremsituationen auf Brutflößen. Vogelwelt 119: 181-192.
- Sudmann, S.R. (1998b): Fachliche Grundlagen für die Ausweisung des EU-Vogelschutzgebietes „Unterer Niederrhein“ 1983 und 1998. Gutachten im Auftrag des NABU Deutschland, Landesverband NRW, Kreisverbände Kleve und Wesel.
- Sudmann, S.R. (2004a): Auswertung der nationalen Wasservogelzählung im Zeitraum 2001 bis 2004 für Nordrhein-Westfalen. NWO-Monitoringbericht 2004/02 im Auftrag der LÖBF NRW.
- Sudmann, S.R. (2004b): Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*). In: Gedeon, K., A. Mitschke & C. Sudfeldt (Hrsg.): Brutvögel in Deutschland. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland, Hohenstein-Ernstthal: 18-19.
- Sudmann, S.R. (2007): Übersicht zum Brutbestand der Weißwangengans *Branta leucopsis* in Nordrhein-Westfalen. Charadrius 43: 162-170.
- Sudmann, S.R. (2011): Todesfälle von Flußseeschwalben *Sterna hirundo* durch Angelschnüre. Charadrius 47: 196-199.
- Sudmann, S.R. & P.H. Becker (2003): Langzeitmonitoring zur Schadstoffbelastung der niederrheinischen Flußseeschwalbenpopulation (*Sterna hirundo*). J. Ornithol. 144: 238.
- Sudmann, S.R. & P.H. Becker (2004): Kritische PCB-Belastung für den Bruterfolg der Flußseeschwalbe am Niederrhein. Jber. Institut Vogelforschung 6: 21.
- Sudmann, S.R. & D. Doer (2007): Rastbestände nortarktischer Gänse und Halbgänse in Nordrhein-Westfalen 1998/1999 bis 2003/2004. Charadrius 43: 143-154.
- Sudmann, S.R. & M. Jöbges (2002): Brutbestand und Verbreitung von Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*), Haubentaucher (*Podiceps cristatus*), Höckerschwan (*Cygnus olor*), Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) und Blässhuhn (*Fulica atra*) in NRW 2001. Charadrius 38: 99-121.
- Sudmann, S.R. & B.C. Meyer (1993): Aktuelle Situation der niederrheinischen Flußseeschwalbenpopulation (*Sterna hirundo*). Charadrius 29: 151-157.
- Sudmann, S.R. & B.C. Meyer (1996): Verdrängt die Sturmmöwe (*Larus canus*) die Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*) auf Nistflößen? Charadrius 32: 199-205.
- Sudmann, S.R., P.H. Becker & H. Wendeln (1994): Sumpf- (*Asio flammeus*) und Waldohreule (*A. otus*) als Prädatoren in Flußseeschwalbenkolonien (*Sterna hirundo*). Vogelwelt 115: 121-126.
- Sudmann, S.R., F. Distelrath, B.C. Meyer & P. Bernert (1996): Auswirkungen der Einstellung des Angelsports auf den Wasservogelbestand am südlichen Teil des Altrheins Bienen-Praest. Nat. Landschaft 71: 536-540.
- Sudmann, S. R., C. Sudfeldt, S. Glinka, M. Jöbges, A. Müller & G. Ziegler (2002): Methodenanleitung zur Bestandserfassung von Wasservogelarten in NRW, Teil 1: Brutbestände. Charadrius 38: 23-92.
- Sudmann, S.R., M. Boschert & H. Zintl (2003): Hat die Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*) an Flüssen noch eine Chance? Charadrius 39: 48-57.
- Sudmann, S.R., C. Grüneberg, C. Sudfeldt, J. Weiss, M. Jöbges, H. König, V. Laske, G. Santora, M. Schmitz & A. Skibbe (2007): Brutvögel in Nordrhein-Westfalen – das neue Atlas-Projekt. Charadrius 43: 1-12.
- Sudmann, S.R., C. Grüneberg, A. Hegemann, F. Herhaus, J. Mölle, K. Nottmeyer-Linden, W. Schubert, W. von Dewitz, M. Jöbges & J. Weiss (2008): Rote Liste der gefährdeten Brutvogelarten Nordrhein-Westfalens 5. Fassung. Charadrius 44: 137-230.
- Sudmann, S.R., M. Korn, S. Stübing & P. Schmidt (2009): Grunddatenerhebung für das EU-Vogelschutzgebiet „Inselrhein“ (5914-450). Gutachten im Auftrag des RP Darmstadt, durchgeführt von Planungsbüro STERNA.
- Südbeck, P. & T. Krüger (2004): Erhaltungssituation und erforderliche Schutzmaßnahmen für Wiesenvögel in Niedersachsen. In: Krüger, T. & P. Südbeck (Hrsg.): Wiesenvogelschutz in Niedersachsen. Nat.schutz Landschaftspf. Niedersachs. 41: 106-123.
- Südbeck, P., H. Andretzke, S. Fischer, K. Gedeon, T. Schikore, K. Schröder & C. Sudfeldt (Hrsg.) (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.
- Südbeck, P., H.-G. Bauer, M. Boschert, P. Boye & W. Knief (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 4. Fassung, 30. November 2007. Ber. Vogelschutz 44: 23-81.
- Tappe, K. & K. Nottmeyer-Linden (2005): Aktionsräume und Zeitbudgets von Feldsperlingen während der Jungtieraufzucht auf einem Obsthof in Ostwestfalen. Poster zur 138. Jahresversammlung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft 29. September – 4. Oktober 2005 in Stuttgart. Vogelwarte 44:50 / Poster: http://www.bshf.de/images/projekte/sperling/sperling_ergebnis.pdf, letzter Zugriff am 12.7.2011.
- Team Sammelbericht NRW (2007): Bemerkenswerte Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahre 2006. Charadrius 43: 92-122.
- Team Sammelbericht NRW (2008): Bemerkenswerte Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahre 2007. Charadrius 44: 67-115.
- Team Sammelbericht NRW (2009): Bemerkenswerte Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahre 2008. Charadrius 45: 120-171.
- Team Sammelbericht NRW (2010): Bemerkenswerte Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2009. Charadrius 46: 155-206.
- Team Sammelbericht NRW (2011): Bemerkenswerte Vögel in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2010. Charadrius 47: 226-290.
- Teunissen, W.A. (1999): Evaluatie vrijwillige weidevogelbescherming. SOVON-onderzoeksrapport 1999/05. SOVON Vogelonderzoek Nederland. Beek-Ubbergen, Niederlande.
- Thiede, W. & W. Jost (1965): Vogelwelt im Oberbergischen. Gummersbach.
- Thiele, H.U. & H. Lehmann (1959): Die Vögel des Niederbergischen Landes. Jahresber. Naturwissenschaftl. Verein Wuppertal 18: 9-90.
- Thiele, U. (2009): Fördermaßnahmen in der Feldflur. Nat. NRW 3/2009: 14-16.
- Thomas, B. & K. Hubatsch (1992): Erste Brut der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) im Kreis Viersen. Charadrius 28: 156.
- Thomas, T. & K. Fleer (2008): Erste dokumentierte Baumbrut in NRW (2007) und Brutverlauf 2008. AGW-NRW, Jahresber. 2008: 5-6.
- Thomsen, K.-M. (2006): Bestandsentwicklung der Weltpopulation des Weißstorches *Ciconia ciconia* zwischen 1994 und 2002. Charadrius 41: 5-12.
- Thomsen, K.-M., K. Dziewiaty & H. Schulz (2001): Zukunftsprogramm Weißstorch-Aktionsplan zum Schutze des Weißstorches in Deutschland. NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.), Bonn.
- Thomson, D.L., H. Douglas-Home, R.W. Furness & P. Monaghan (1996): Breeding success and survival in the common swift *Apus apus*: a long-term study on the effects of weather. J. Zoology 239: 29-38.
- Tiemeyer, V. (1993): Die Vögel der Stadt Melle. Knoth, Melle.
- Tillmanns, W. (1965): Brutnachweise von Austernfischer, Flußregenpfeifer, Uferschnepfe, Trauer- und Flußseeschwalbe bei Emmerich-Hüthum. Charadrius 1: 47-48.
- Tillmanns, W. (1967): Über Bruterfolge beim Kiebitz (*Vanellus vanellus*). Charadrius 3: 55-56.
- Tillmanns, W. (1979): Brutnachweis des Säbelschnäblers (*Recurvirostra avocetta*) im Rheinland. Charadrius 15: 131.
- Tillmanns, O. & N. Wolf (2011): Ergebnisse einer Graureiher-Umsiedlung *Ardea cinerea* in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss). Charadrius 47: 43-48.
- Tomec, M. (2007): Grünspechtvorkommen (*Picus viridis*) in Oberhausen 1955-2004. Förderverein Nationalpark Eifel e.V. (Hrsg.): Tagung der Projektgruppe Spechte in der DO-G 24.-26.3.2006, Tagungsbd.: 44-46.
- Tomec, M. & N. Killmann (1998): Zum Grünspechtvorkommen (*Picus viridis*) im Ruhrgebiet am Beispiel von Oberhausen/Bottrop und Herne. Charadrius 34: 144-154.

- Tomialojc, L. & T. Stawarczyk (2003): Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław.
- Todte, I. (2004): Bienenfresser (*Merops apiaster*). In: Gedeon, K., A. Mitschke & C. Sudfeldt (Hrsg.): Brutvögel in Deutschland. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland, Hohenstein-Ernstthal: 24-25.
- Treep, J. (2000): Flamingos presumably escaped from captivity find suitable habitat in Western Europe. *Waterbirds* 23 (Special Publication 1): 32-37.
- Treep, J. (2011): Flamingo´s in het Zwillbrocker Venn. Eigenverlag, Beilen.
- Treep, J. & D. Ikemeyer (2006): Flamingos im Zwillbrocker Venn. LÖBF-Mitt. 3/2006: 12-16.
- Tricot, J. (1967): Expansion actuelle de la Mésange Rémiz (*Remiz pendulinus*) en Europe. *Aves* 4: 3-14.
- Trierweiler, C., R.H. Drent, J. Komdeur, K.-M. Exo, F. Bairlein & B.J. Koks (2008): De jaarcyclus van de Grauwe Kiekendief: een leven gedreven door woelmuizen en sprinkhanen. *Limosa* 81:107-115.
- Tucker, G.M. & M.F. Heath (1994): *Birds in Europe: their conservation status*. Cambridge, U.K.: BirdLife International (BirdLife Conservation Serie no. 3).
- Tye, A. (1992): Assessment of territory quality and its effects on breeding success in a migrant passerine, the Wheatear *Oenanthe oenanthe*. *Ibis* 134:273-285.
- Tyler G.A., R.E. Green & C. Casey (1998): Survival and behaviour of Corn-crake *Crex crex* chicks during the mowing of agricultural grassland. *Bird Study* 45: 35-50.
- Valera, F., P. Rey, A.M. Sanchez-Lafuente & J. Mufioz-Cobol (1990): The Situation of Penduline Tit (*Remiz pendulinus*) in Southern Europe: A New Stage of its Expansion. *J. Ornithol.* 131: 413-420.
- Valera, F., P. Rey, A.M. Sanchez-Lafuente & J. Mufioz-Cobol (1993): Expansion of Penduline Tit (*Remiz pendulinus*) through Migration and Wintering. *J. Ornithol.* 134: 273-282.
- van den Berg, A.B. & C.A.W. Bosman (1999): Rare birds of the Netherlands. GMB Uitgeverij, Haarlem & Stichting Uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- van den Berg, A.B. & M. Haas (2010): WP reports. *Dutch Birding* 32: 266-276.
- van der Winden, J. (2005): Black Tern *Chlidonias niger* conservation in The Netherlands – a review. *Vogelwelt* 126: 187-193.
- van der Winden, J. (2010): De effecten van Grauwe ganzen op broedkolonies van de Zwarte stern. *De Levende Natuur* 111 (3).
- van der Winden, J. & R. Kleefstra (2007): Zwarte sterns in Fryslân: verleden, heden en kansen voor de toekomst. Veldonderzoek naar broedsucces en habitatgebruik als basis voor toekomstig beheer en beleid. Bureau Waardenburg, Culemborg en SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
- van Diermen, J., F. Willems & S.R. Sudmann (2002): Vogels in de Gelderse Poort, deel 1: broedvogels 1960-2000 / *Vogelwelt der Gelderse Poort – Teil 1: Brutvögel 1960-2000*. Faunawerkgroep Gelderse Poort (Hrsg.), Beek-Ubbergen.
- van Diermen, J., W. van Manen & E. Baaij (2009): Habitat use, home range and behaviour of Honey Buzzards *Pernis apivorus* tracked on the Veluwe, central Netherlands, using GPS. *De Takkeling* 17: 109-133.
- van Dijk, K. & F. Majoor (2011): Geboortedispersie van Nijl ganzen van Nederland naar Duitsland en vice versa. *Limosa* 84: 82-84.
- van Dijk, A.J., A. Boele, L. van den Bremer, F. Hustings, W. van Manen, A. van Kleunen, K. Koffijberg, W. Teunissen, C. van Turnhout, B. Voslamber, F. Willems, D. Zoetebier & C.L. Plate (2007): Broedvogels in Nederland in 2005. SOVON-monitoringsrapport 2007/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
- van Dijk A.J., A. Boele, F. Hustings, K. Koffijberg & C.L. Plate (2010a): Broedvogels in Nederland in 2008. SOVON-monitoringsrapport 2010/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland. Beek-Ubbergen, Nederlande.
- van Dijk, A., F. Hustings, A., Boele, K. Koffijberg, D. Zoetebier & C.L. Plate (2010b): Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2006 en 2007. *Limosa* 83: 1-20.
- van Nieuwenhuyse, D., J.-C. Genot & D.H. Johnson (2008): *The Little Owl. Conservation, Ecology and Behavior of Athene noctua*. Cambridge, University Press.
- van Paassen, A. & W. Teunissen (2010): Weidevogelbalans 2010. Landschapsbeheer Nederland & SOVON Vogelonderzoek Nederland. Utrecht / Beek-Ubbergen, Nederlande.
- van Turnhout, C. (2005): Het verdwijnen van de Duinpieper als broedvogel uit Nederland en Noordwest-Europa. *Limosa* 78: 1-14.
- Vandenbergh, C., G. Prior, N.A. Littlewood, R. Brooker & R. Pakerman (2009): Influence of livestock grazing on meadow pipit foraging behaviour in upland grassland. *Basic and Applied Ecology* 10: 662-670.
- Venne, C. (2003): Vorkommen und Habitatwahl der Heidelerche (*Lullula arborea*) im Landschaftsraum Senne in Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 39: 114-125.
- Verbücheln, G. & M. Jöbges (2000): Verbreitung und aktueller Zustand der Heiden, Sandtrockenrasen und Borstgrasrasen in Nordrhein-Westfalen. *NUA-Hefte* 6: 6-26.
- Verjans, T. (1995): Wiederansiedlung der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) im Stadtgebiet Korschenbroich (Kreis Neuss). *Charadrius* 31: 191-192.
- Vermeersch, G., A. Anselin, K. Devos, M. Herremans, J. Stevens, J. Gabriels & B. van der Krieken (2004): Atlas van de Vlaamse Broedvogels 2000-2002. Medelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 23, Brussel.
- Vlug, J.J. (1993): Habitatwahl des Rothalstauchers (*Podiceps grisegena*) in Schleswig-Holstein, in Zusammenhang mit seiner Nahrungsökologie. *Corax* 15: 91-117.
- Vlug, J.J. (2000): Zur Brutbestandsentwicklung und Ökologie des Rothalstauchers (*Podiceps grisegena*) in Schleswig-Holstein und Hamburg 1969-1998 - mit ergänzenden Bemerkungen zur früheren Situation und zu den Verhältnissen in den Nachbarländern. *Corax* 18: 160-179.
- Volkmer, H. (2000): Das Auerwild im Sauerland. In: Kreisjägerschaft Hochsauerland e.V. (Hrsg.): *Sauerländer Jäger, der Natur verbunden*. Arnberger.
- Volpers, M. (1981): Der Einflug der Sumpfohreule (*Asio flammeus*) im Winter 1978/79 in Nordrhein-Westfalen. *Charadrius* 17: 103-111.
- von Bülow, B. (1990): Verbreitung und Habitate des Ortolans (*Emberiza hortulana*, L. 1758) am Rande der Hohen Mark bei Haltern/Westfalen, *Charadrius* 26: 151-189.
- von Bülow, B. (1994): Die Sturmmöwe (*Larus canus*) als Brutvogel im westfälischen Industrierevier. *Charadrius* 29: 82-84.
- von Bülow, B. & E. Kretschmar (1996): Weitere Bruten von Sturmmöwen (*Larus canus*) im westfälischen Industrierevier. *Charadrius* 32: 197-198.
- von Bülow, B., M. Kipp & P. Schnitzler (2007): Ortolane *Emberiza hortulana* in Nordrhein-Westfalen verschwunden? *Charadrius* 43: 35-37.
- von Dewitz, W. (2003): Hilfsmaßnahmen für den Eisvogel (*Alcedo atthis*) – Praxisbericht. *Charadrius* 39: 65-70.
- von Dewitz, W., B. Gießing, M. Kuhn & H.-J. Schmaus (2011): Baumbrut des Mauerseglers *Apus apus* in Brühl/Rheinland. *Charadrius* 47: 87-92.
- von Fürstenberg, W. (2000): 200 Jahre Jagd und Hege im Arnberger Wald 1800 bis 1999. In: Kreisjägerschaft Hochsauerland e.V. (Hrsg.): *Sauerländer Jäger, der Natur verbunden*. Arnberger.
- von Hirschheydt, H. (2004): Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz & Schweizerische Vogelwarte Sempach (Hrsg.): *Merklblätter für die Vogelschutzpraxis*. <http://infont.vogelwarte.ch/upload/d-nhrauschwalbe.pdf>.
- von Wicht, U. (1998/99): Rostgans – *Tadorna ferruginea*. In: Heine, G., H. Jacoby, H. Leuzinger & H. Stark (Hrsg.): *Die Vögel des Bodenseegebietes*. *Ornithol. Jahresh.* Baden-Württ. 14/15: 247-249.
- von Wicht, U. (1999): Beobachtungen über das Brüten der Rostgans *Tadorna ferruginea* am Untersee. *Ornithol. Beob.* 96: 37-40.
- Voous, K.-H. (1960): *Atlas van de Europese Vogels*. Elsevier, Amsterdam, Brussel.
- Voslamber, B., H. van der Jeugd & K. Koffijberg (2010): Broedende ganzen in Nederland. *De Levende Natuur* 111: 40-44.
- Vossmeier, A. (2006): 10 Jahre Artenschutzprojekt Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger* am Niederrhein – Bilanz und Ausblick. *Charadrius* 42: 49-55.
- Vossmeier, A. (2009): Artenschutzprojekt Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger* – zahlreiche Haubentaucher *Podiceps cristatus* nisten sich in der einzigen Brutkolonie in NRW ein. *Charadrius* 45: 57-61.
- Vossmeier, A., F.-J. Niehues & M. Brühne (2006): Der Steinkauz *Athene noctua* im Kreis Kleve – Ergebnisse einer kreisweiten Bestandserhebung und Erfassung wichtiger Lebensraumelemente sowie GIS-Analyse der Revierausstattung. *Charadrius* 42: 178-191.
- Wagner, T. (1993): Saisonale Veränderungen in der Zusammensetzung der Nahrung beim Neuntöter (*Larus collurio*). *J. Ornithol.* 134: 1-11.
- Wahl, J., D. Doer, F. Peterskeit & N. Anthes (2004): Drastischer Bestandsrückgang der Feldlerche *Alauda arvensis* in Münster (Westfalen) von 1997 bis 2004. *Charadrius* 40: 57-67.
- Walker, M.D., J. Rozman & K. Witte (2009): Brutkolonie des Mauerseglers in einer Autobrücke. *Vogelwarte* 47: 41-43.
- Wegner, P. (1989): Altes und Neues vom Wanderfalken (*Falco peregrinus*) im Rheinland. *Charadrius* 25: 70-84.
- Wegner, P. (1994): Die Rückkehr des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) in NRW. *Charadrius* 30: 2-14.
- Wegner, P. (1998): Der Wanderfalke als Brutvogel in Nordrhein-Westfalen. In: Rockenbauch, D. (Hrsg.): *Der Wanderfalke in Deutschland und umliegenden Gebieten*. Bd. 1: 140-155. C. Hölzinger, Ludwigsburg.
- Wegner, P. (2000a): Hybridisierung bei Großfalken – Ist der Wanderfalke in Gefahr? In: Was macht der Halsbandsittich in der Thujahecke? NABU-Naturschutztagung Braunschweig 2000: 35-43.
- Wegner, P. (2000b): Die Biozidbelastung von Eiern des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) aus NRW und dem nördlichen Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern. *Charadrius* 36: 113-125.
- Wegner, P. & P. Fürst (2009): Long-term investigation of the degree of exposure of German Peregrine Falcons to damaging chemicals from the environment and recent results. In: Sielicki, J. & T. Mizera (Hrsg.): *Peregrine Falcon populations – status and perspectives in the 21st century*: 625-630. Warsaw – Poznan.

- Wegner, P., G. Kleinstäuber, F. Baum & F. Schilling (2005): Longterm investigation of the degree of exposure of German Peregrine Falcons (*Falco peregrinus*) to damaging chemicals from the environment. *J. Ornithol.* 146: 34-54.
- Wegner, P., H. Brücher, S. Brücher, T. Höller, M. Jöbges, M. Lindner, G. Sell, G. Speer, T. Thomas & J. Volkhausen (2009): Development of an urban population of Peregrine Falcons in North Rhine-Westphalia, Germany: population status, nest site selection and some biological results. In: Sielicki, J. & T. Mizera (Hrsg.): *Peregrine Falcon populations – status and perspectives in the 21st century: 729-746.* Warzaw – Poznan.
- Wegner, P., T. Thomas & M. Kladny (2010): Verpaarte NRW-Falken in den Niederlanden und Belgien. *AGW-NRW, Jahresber.* 2010: 14-16.
- Weiss, J. (1985): Überlegungen für ein Haselhuhn-Schutzkonzept. *LÖLF-Mitt.* 3/1985: 44-45.
- Weiss, J. (1998): Die Spechte in NRW. *Charadrius* 34: 104-125.
- Weiss, J. (2004): Heimische Spechte und ihr Lebensraum: Unterschiedliche Ansprüche an Wald und Bäume. *Falke* 51: 68-73.
- Weiss, J. (2005): Altbaumschutz im Wirtschaftswald. In: Deutsche Wildtierstiftung (Hrsg.): *Schwarzspecht-Symposium: 277-290.*
- Weiss, J., C. Michels & H. Jöbges (2002): Entwicklung der Wiesenvogelbestände in Nordrhein-Westfalen unter dem Einfluss des Feuchtwiesenprogramms. *MUNLV & Biol. Station Kreis Steinfurt* (Hrsg.): *Zur Situation feuchtgrünlandabhängiger Vogelarten in Deutschland: 11-24.*
- Weiss, J., M. Jöbges & H. König (2007): Spechtland Nordrhein-Westfalen. Förderverein Nationalpark Eifel e.V. (Hrsg.): *Tagung der Projektgruppe Spechte in der DO-G 24.-26.3.2006, Tagungsband: 18-23.*
- Weiss, J., B. Hille & M. Jöbges (2010): 70 Jahre Vogelschutzwarte in NRW – Eine wechselvolle Geschichte. *Nat. NRW* 1/2010: 15-19.
- Weitnauer, E. & E.R. Scherner (1980): *Apus apus* (Linnaeus 1758) – Mauersegler. In: Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer (Hrsg.): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas.* Bd. 9: 671-712. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
- Weitz, H. (1984): Nest und Neststandort der Heckenbraunelle (*Prunella modularis*) in Laubmischwaldbiotopen. *Charadrius* 20: 167-172.
- Weitz, H. (1988): Zur Brutbiologie der Heckenbraunelle (*Prunella modularis*). *Charadrius* 24: 73-84.
- Westerfrölke, P. (1957): Schwarzhalstaucher auf dem Möhnesee. *Nat. Heimat* 17: 73-74.
- Westhoff, F. (1889): Zur Avifauna des Münsterlandes. *Nat. Offenbarung* 35: 577-598.
- Wetlands International (2006): *Waterbird Population Estimates – Fourth Edition.* Wetlands International, Wageningen, Niederlande.
- White, G.J. & J.C. Gilbert (Hrsg.) (2003): *Habitat creation handbook for the minerals industry.* RSPB, Sandy, UK.
- Whittingham, M.J., R.D. Swetnam, J.D. Wilson, D.N.E. Chamberlain & R.P. Freckleton (2005): Habitat selection by yellowhammers *Emberiza citrinella* on lowland farmland at two spatial scales: implications for conservation management. *J. Appl. Ecol.* 42: 270-280.
- Wiesner, J. (1997): Zur gegenwärtigen Kenntnis von Verbreitung und Bestandssituation des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) in Deutschland. *Naturschutzreport* 13: 82-98.
- Wille, U. (1963): Zum Vorkommen der Brandgans am Niederrhein. *Niederrhein* 30: 70-73.
- Wille, V., A. Barkow, J. Linke & N. Feige (2011): Langfristige Entwicklung des Brutbestandes der Uferschnepfe *Limosa limosa* am Unteren Niederrhein. *Charadrius* 47: 122-140.
- Willi, T., F. Korner & M. Gruebler (2011): Rauchschnalben *Hirundo rustica* brauchen Nutztiere, Mehlschnalben *Delichon urbicum* Nisthilfen. *Ornithol. Beob.* 108: 215-224.
- Wink, M. (1967): Zur Verbreitung der Elster (*Pica pica*) in Bonn. *Charadrius* 3: 192-194.
- Wink, M. (1968): Brutversuch der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) an der Siegmündung. *Charadrius* 4: 56.
- Wink, M. (1971): Die Nachtigall (*Luscinia m. megarhynchos* Brehm) in der Eifel. *Charadrius* 7: 41-56.
- Wink, M. (1973a): Die Verbreitung der Nachtigall (*Luscinia m. megarhynchos*) im Rheinland. *Charadrius* 9: 65-80.
- Wink, M. (1973b): Schlechtwettereinfluß im Frühjahr 1972 auf die Entwicklung einer Nachtigall- (*Luscinia megarhynchos*) Population. *Charadrius* 9: 109-113.
- Wink, M. (1987): Die Vögel des Rheinlandes, Bd. 3, Atlas zur Brutvogelverbreitung im Rheinland. *Beitr. Avifauna Rheinland* 25-26, Düsseldorf.
- Wink, M. (1995): Vogelbesiedlung auf neuen Windbruchflächen der Eifel. *Charadrius* 31: 114-116.
- Wink, M., C. Dietzen & B. Gießing (2005): Die Vögel des Rheinlandes. Atlas zur Brut- und Wintervogelverbreitung 1990-2000. *Beitr. Avifauna NRW* Bd. 36.
- Winkel, W. & H. Hudde (1993): *Ficedula hypoleuca* – Trauerfliegenschnäpper, Trauerschnäpper. In: Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer (Hrsg.): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas.* Bd. 13: 165-263. Aula-Verlag, Wiesbaden.
- Wirthmüller, R. (1997): Zur Brutbiologie der Schwanzmeise (*Aegithalys caudatus*) im Rheinland. *Charadrius* 33: 16-25.
- Wirthmüller, R. (2002): Bruten des Mittelspechtes (*Dendrocopus medius*) in Erlenwäldern. *Charadrius* 38: 246-255.
- Wirthmüller, R. (2006): Beobachtungen zur Brutbiologie und zum Verhalten des Kleinspechtes *Dryobates minor*. *Charadrius* 42: 99-109.
- Witt, H. (1976): Sturm- und Silbermöwe am Franziskus-See (Ville bei Köln). *Charadrius* 12: 1-5.
- Witt, K. (2003): Mandarinente *Aix galericulata*, ein etabliertes Neozoon in Deutschland. *Vogelwelt* 124: 17-24.
- Witt, K., H.-G. Bauer, P. Berthold, P. Boye, O. Hüppop & W. Knief (1996): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. *Ber. Vogelschutz* 34: 11-35.
- Wittling, N. (1984): Bruten von Sturmmöwe, Zwergtaucher, Löffel- und Reiherente am NSG Entenfang bei Wesseling. *Charadrius* 20: 52.
- Wörth, H. (1980): Die Verbreitung der Grauammer (*Emberiza calandra*) in Rheinland-Pfalz. *Mainzer Naturwiss. Archiv* 18: 163-203.
- WOG [Westfälische Ornithologen-Gesellschaft] (1974): Die in Westfalen gefährdeten Vogelarten (Rote Liste, Stand 1.1. 1975). *Alcedo* 1: 82-87.
- Woike, M. (1980): Das Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*) in NRW – ein Stück Vergangenheit? Ein Beispiel für ein Artenhilfsprogramm. *Natur- Landschaftskd. Westf.* 16 (1):13-20.
- Wolf, C., H. Brombach & I. Fahne (1991): Die Kiesgrube Hornpottweg. Eigenverlag, DBV Leverkusen & Köln.
- Wonneberger, G. (1975): Zur Brutbiologie der Rohrweihe am Niederrhein. *Charadrius* 11: 101-115.
- Wonneberger, G. (1996): Ergebnisse 10jähriger Untersuchungen (1986-1995) an eingebürgerten Graugänsen (*Anser anser*) im Naturschutzgebiet „Fleuthkuhlen“, Kreis Kleve. *Charadrius* 32: 96-109.
- Wonneberger, G. & J. Lomme (2001): Erfahrungsbericht über die Erfassung von Wasserrallen (*Rallus aquaticus*) mit Klangattrappe im Naturschutzgebiet Fleuthkuhlen, Kreis Kleve. *Charadrius* 37: 168-175.
- Würfels, M. (1994a): Entwicklung einer städtischen Population des Habichts (*Accipiter gentilis*) und die Rolle der Elster (*Pica pica*) im Nahrungsspektrum des Habichts – Ergebnisse vierjähriger Beobachtungen im Stadtgebiet von Köln. *Charadrius* 30: 82-93.
- Würfels, M. (1994b): Siedlungsdichte und Beziehungsgefüge von Elster, Rabenkrähe und Habicht 1992 im Stadtgebiet Köln. *Charadrius* 30: 94-103.
- Würfels, M. (1998): Entwicklung der Siedlungsdichte der Elster (*Pica pica*) von 1992 bis 1996 im Bereich der Habichtbrutplätze und auf weiteren Probeflächen in Köln. *Charadrius* 34: 90-96.
- Würfels, M. (1999): Ergebnisse weiterer Beobachtungen zur Populationsentwicklung des Habichts (*Accipiter gentilis*) im Stadtgebiet von Köln 1993-1998 und zur Rolle der Elster (*Pica pica*) im Nahrungsspektrum des Habichts. *Charadrius* 36: 20-32.
- Wulf, H.-D. (1987): Erste Bruten der Brandgans (*Tadorna tadorna*) an der Lippe in Marl (Westfalen). *Charadrius* 23: 208-209.
- Zang, H. (1980): Der Einfluß der Höhenlage auf Siedlungsdichte und Brutbiologie höhlenbrütender Singvögel im Harz. *J. Ornithol.* 121: 371-386.
- Zang, H. (2005): Ringdrossel – *Turdus torquatus*. In: Zang, H. & H. Heckenroth (Hrsg.): *Die Vögel Niedersachsens, Drosseln, Grasmücken, Fliegenschnäpper.* *Nat.schutz Landschaftspfl. Niedersachs., Sonderreihe B 2.9:* 129-135
- Zang, H. (2009): Tannenhäher – *Nucifraga caryocatactes*. In: Zang, H., H. Heckenroth & P. Südbeck (Hrsg.): *Die Vögel Niedersachsens, Rabenvögel bis Ammern.* *Nat.schutz Landschaftspfl. Niedersachs., Sonderreihe B 2.11:* 83-92.
- Zang, H. & J. Grützmann (2009): Grauammer – *Emberiza calandra*. In: Zang, H., H. Heckenroth & P. Südbeck (Hrsg.): *Die Vögel Niedersachsens, Rabenvögel bis Ammern.* *Nat.schutz Landschaftspfl. Niedersachs., Sonderreihe B 2.11:* 446-460.
- Zang, H. & P. Südbeck (2000): Zur Situation der Haubenlerche *Galerida cristata* in Niedersachsen. *Vogelwelt* 121: 173-181.
- Zenker, W. (1980): Untersuchungen zur Siedlungsdichte der Vögel in einem naturnahen Eichen-Ulmen-Auenwald im Erfttal (Naturschutzgebiet Kerpen Bruch). *Beitr. Avifauna Rheinland* 13: 1-140.
- Ziegler, G. (1967): Westfalens letzte Störche. *Orn. Beitr. Ostwestf.* 1: 5-8.
- Ziegler, G. (1984): Erste Brutnachweise für Tafelente (*Aythya ferina*) und Reiherente (*Aythya fuligula*) im Kreis Minden-Lübbecke. *Charadrius* 20: 255.
- Ziegler, G. (1988): Die Weißstörche Westfalens. *Nordrhein-Westfalen-Stiftung Nat.schutz, Heimat- Kulturpfl., Minden.*
- Ziegler, G. (1989): Tannenmeise (*Parus ater*) als Stadt- und Gebäudebrüter in Minden/Westfalen. *Charadrius* 25: 38-39.
- Ziegler, G. (1993a): Die Weißstörche Westfalens. 1. Ergänzung. Aktionskomitee „Rettet die Weißstörche im Kreis Minden-Lübbecke“ e.V., Minden.

- Ziegler, G. (1993b): Revieransprüche und „kolonieartiges“ Brüten von Höckerschwänen an der Mittelweser. *Vogelwelt* 114: 178-182.
- Ziegler, G. (1994): Erfassung der Brutpaar-Bestände von Stockente (*Anas platyrhynchos*) und Reiherente (*Aythya fuligula*) im RAMSAR-Gebiet „Weserstaustufe Schlüsselburg“. *Charadrius* 30: 203-207.
- Ziegler, G. (2000): Erneute Brut der Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*) an der Mittelweser in Nordrhein-Westfalen. *Vogelkd. Ber. Niedersachs.* 32: 74.
- Ziegler, G. (2005): Feuchtgebietsgebundene Vogelarten der Weserstaustufe Schlüsselburg – eine kommentierte Artenliste für den Zeitraum 1961-2003. *Charadrius* 41: 97-128.
- Ziegler, G. & J. Niemann (1992): Binnenlandbrut der Silbermöwe (*Larus argentatus*) an der Mittelweser. *Charadrius* 28: 54-55.
- Zieseimer, F. (1997): Raumnutzung und Verhalten von Wespenbussarden (*Pernis apivorus*) während der Jungenaufzucht und zu Beginn des Wegzuges – eine telemetrische Untersuchung. *Corax* 17: 19-34.
- Zillich, S. & H. Oelke (1997): Verbreitungsanalyse von drei Neusiedlern der Göttinger Avifauna: Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*), Girlitz (*Serinus serinus*), Birkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*). Stand 1994. *Beitr. Nat. kd. Niedersachs.* 50: 53-72.
- Zimmermann, H. (1987): Kormoran. In: Klafs, G. & J. Stübs (Hrsg.): *Die Vogelwelt Mecklenburgs*. Gustav Fischer Verlag, Jena.
- Zingel, D. (2000): 25 Jahre freilebende Papageien in Wiesbaden. *Jahrb. Nassauischen Vereins Nat.kd.* 121: 129-141.
- Zucchi, H. & W. Elstrod (1992): Zur Siedlungsdichte der Gebirgsstelze an einem Fließgewässer im Osnabrücker Raum. *Vogelkd. Ber. Niedersachs.* 24: 1-10.
- Zwarts, L., R.G. Bijlsma, J. van der Kamp & E. Wymenga (2009): *Living on the edge: Wetlands and birds in a changing Sahel*. KNNV Publishing, Zeist, The Netherlands.

Weitere genutzte Internetadressen:
www.birdnet.de
www.bund-dhm.de
www.vnv-hsk.de
<http://stoerche-minden-luebbecke.de>
<http://niederrheinstoerche.de>
www.rabenvoegel.de/dohlen.htm